

Systematische Begründung  
der Lieschen Abbildung der  
komplexen Ebene und Ableitung der  
Geraden-Kugeltransformation aus der  
komplexen Geometrie.

---

INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung

der

Doktorwürde

genehmigt

von der philosophischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität zu Bonn.

Von

WILHELM BRACH

aus Bonn.

BONN 1937

Buchdruckerei Kubens, Inhaber H. Schnitzler, Maxstr. 75

Berichterstatter : Prof. Dr. E. A. Weiss  
Mitberichterstatter : Prof. Dr. H. Beck



# I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Einleitung . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  |
| Erstes Kapitel: Systematische Begründung der Liefchen Abbildung der komplexen Ebene.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| § 1. Die Grundlagen der Liefchen Abbildung . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8  |
| 1. S. Lies „Repräsentation“. 2. Die Segresche Abbildung.<br>3. Herleitung der Liefchen Abbildung aus der Segreschen.                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| § 2. Der komplexe Kegelschnitt . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 |
| 4. Bild einer Kurve zweiter Ordnung im Segreschen $R_4$ . Die Bildfläche $\Gamma$ . 5. Das Polarsystem der Fläche $\Gamma$ als Bild des Polarsystems des Kegelschnitts C. 6. Die reellen Tangentialebenen von $\Gamma$ — Bilder der Geraden der zugehörigen Kurve 2. Klasse. 7. Bild eines Kegelschnitts im Liefchen Bild- $R_3$ . 8. Pol und Polare im Liefchen $R_3$ . |    |
| § 3. Die Ketten der komplexen Ebene . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 |
| 9. Die binäre Punktkette. 10. Die binäre Geradenkette. 11. Zweidimensionale Ketten: Bild einer ternären Punkt- und Geradenkette im Segreschen Bild- $R_4$ . 12. Bild einer ternären Punkt- und Geradenkette im Liefchen- $R_3$ . 13. Bilder dreidimensionaler Punkt- und Geradenketten im Segreschen- $R_4$ und im Liefchen Bild- $R_3$ .                                |    |
| § 4. Ketten auf Kegelschnitten . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38 |
| 14. Bilder von Punktketten auf Kurven 2. O. im Segreschen- $R_4$ und im Liefchen Bild- $R_3$ . 15. Bilder von Geradenketten auf Kurven 2. Klasse im Segreschen Bild- $R_4$ und im Liefchen Bild- $R_3$ .                                                                                                                                                                 |    |
| Zweites Kapitel: Ableitung der Geradenkugeltransformation aus der Komplexen Geometrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| § 5. Begründung der Geradenkugeltransformation aus der Geometrie der komplexen Ebene . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43 |
| 16. Die Euklidische Geradenkugeltransformation. 17. Bild von Punkt- und Geradenhyperkegelschnitt im Segreschen- $R_4$ . 18. Die Nichteuklidische Geradenkugeltransformation. 19. Zusammenhang zwischen den beiden verschiedenen Arten der Begründung der Geradenkugeltransformation.                                                                                     |    |
| § 6. Konstruktion der Nichteuklidischen Geradenkugeltransformation . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 |
| 20. Konstruktion der Abbildung: Punkte eines $R_3$ — Geraden der $M_3^2$ . 21. Die durch die Projektion der $M_3^2$ hervorgerufene Einzweideutigkeit der Verwandtschaft. 22. Konstruktion der Nichteuklidischen Geradenkugeltransformation.                                                                                                                              |    |



## EINLEITUNG.

Im Jahre 1869 veröffentlichte S. Lie<sup>1)</sup> in seiner Erstlingsarbeit<sup>2)</sup> eine Abbildung der Punkte der komplexen Ebene auf die reellen Massenpunkte eines  $R_3$ . Diese Abbildung kam für Lie dadurch zu großer Bedeutung, daß sie zum Ausgangspunkte für die Entdeckung der Geradenkugeltransformation<sup>3)</sup> wurde. Zur Weiterentwicklung der Theorie hat aber die Abbildung nichts beigetragen. Hierzu war erstens der benutzte analytische Apparat nicht ausreichend, und zweitens waren Lie die Grundlagen der komplexen Geometrie noch unbekannt, die erst in den Jahren 1885, 1890 von C. Juel<sup>4)</sup> und hauptsächlich (1889—91) von C. Segre<sup>5)</sup> entwickelt wurden. So kam es, daß die Liesche Abbildung und mit ihr die auf sie begründete Ableitung der Geradenkugeltransformation in Vergessenheit geriet, zumal auch Lie selbst in seinen späteren Arbeiten<sup>6)</sup> nicht mehr an sie anknüpfte.

---

<sup>1)</sup> Wir zitieren die „Gefammelten Abhandlungen“, herausgegeben von F. Engel und P. Heegaard, Leipzig, Teubner und Oslo, Aschehoug, Bd. 1, 1934, Bd. 2 I, 1935.

<sup>2)</sup> S. Lie, Repräsentation der Imaginären der Plangeometrie, in Gef. Abh. Bd. 1, Abh. I.

<sup>3)</sup> S. Lie, Sur une transformation géométrique, Comptes Rendus 71 (1870) S. 579—583 = Gef. Abh. Bd. 1, Abh. VIII S. 88—92.

<sup>4)</sup> C. Juel, Bidrag til den imaginære Linies og den imaginære Plans Geometri, Diff. Kjobenhavn 1885, und Über einige Grundgebilde der projektiven Geometrie, Acta math. 14 (1890) S. 1.

<sup>5)</sup> C. Segre, Un nuovo campo di ricerche geometriche, Torino Atti 25 (1889—90) S. 276, 430, 592; 26 (1890—91) S. 35.

<sup>6)</sup> S. Lie, Über Komplexe, insbesondere Linien- und Kugelkomplexe, mit Anw. auf die Theorie part. Diff.-gl., Math. Ann. 5 (1872) = Gef. Abh. Bd. 2 I, Abh. I.

An die Stelle der Lieschen Repräsentation trat die C. Segresche<sup>7)</sup> Abbildung der Punkte der komplexen Ebene auf den reellen Zug einer  $M_4^6$  im  $R_8$  und den aus ihr durch stereographische Projektion entstehenden und zur Gaußschen Ebene analogen reellen  $R_4$ , der besonders in der neueren Zeit durch seine Anwendung in der Funktionentheorie von zwei komplexen Variablen allgemein bekannt wurde.

Unter den Begründungen der Geraden-Kugeltransformation gewann aber diejenige den Vorzug, die auf der Kleinschen Abbildung des Geradenkontinuums auf die Plücker'sche  $M_4^2$  des  $R_8$  beruht, und die hauptsächlich durch die Arbeiten von E. Study synthetisch und analytisch ihre vollkommene und endgültige Ausgestaltung fand. Diese Methode der Ableitung bot zudem den Vorteil, gleichzeitig Euklidische und Nichteuklidische Geraden-Kugeltransformation zu umfassen, während Lies erste Begründung nur die Ableitung der Euklidischen Geraden-Kugeltransformation zuläßt. Lie hatte sogar — wahrscheinlich aus diesem Grunde — zunächst die Möglichkeit einer Nichteuklidischen Geraden-Kugeltransformation — Abbildung der Punkte eines Raumes auf den Tangentenkomplex einer Fläche 2. O. eines zweiten Raumes übersehen.<sup>8)</sup>

In der vorliegenden Arbeit wird nun im ersten Kapitel die Liesche Abbildung aus der Segreschen abgeleitet, und zwar, nachdem die Grundlage analytisch gegeben ist, nach rein synthetischen Methoden. Nacheinander werden die Bilder der komplexen Kegelschnitte, der binären und ternären Ketten (die bei Lie implizite vorkommen, ohne daß Lie ihre Bedeutung als Grundelemente

---

<sup>7)</sup> C. Segre, Rappresentazioni reali delle forme complesse, Math. Ann. 40 (1891) S. 413; vgl. auch B. Segre, Sobre algunas representaciones reales del plano complejo, Revista Mat. Hispano-Americana, 1928; desgl. auch E. Study, Das Imaginäre in der ebenen Geometrie, 2. Teil, herausgeg. von E. A. Weiß, Bonn 1933 und 1934; und F. Baños, Estudio sintético de los espacios complejos de  $n$  dimensiones, Publ. del Lab. y Sem. Mat. II, Madrid, 1917.

<sup>8)</sup> S. Lie in Gef. Abh. 1, Nr. XI, S. 106, Z. 17. Diese Möglichkeit wurde zuerst von F. Schur eingesehen, vgl. Nachruf von F. Engel auf F. Schur in Jhrbr. der D. M. V., 45 (1935) S. 1. — Daß es tatsächlich unmöglich ist, auf dem von Lie angegebenen Wege die N.-E.-G.-K.-T. zu erhalten, zeigen wir auf S. 44.

der komplexen Ebene erkannt hätte), insbesondere der binären Ketten auf Kegelschnitten behandelt.<sup>9)</sup>

Das zweite Kapitel behandelt die Herleitung der Geraden-Kugeltransformation aus der komplexen Geometrie. Die Transformation wird im euklidischen Falle aus zwei im reellen Bild- $R_4$  geeignet gewählten  $R_3$  von der Bildverwandtschaft einer Korrelation der komplexen Ebene ausgeschnitten.<sup>10)</sup> Diesen beiden  $R_3$  entsprechen in der komplexen Ebene zwei als Örter komplexer Punkte dreidimensionale binäre Geradenketten. Eine solche Geradenkette kann als Ausartung eines Punkthyperkegelschnitts aufgefaßt werden.

Unsere Untersuchung zeigt nun, wie man auch die Nichteuklidische Geraden-Kugeltransformation als Bild einer Korrelation der komplexen Ebene erhalten kann, wenn man von einem regulären Punkthyperkegelschnitt ausgeht. Es ergibt sich auf diesem Wege u. a. eine synthetische Konstruktion der bekannten Abbildung der Geraden eines linearen Komplexes auf die Punkte einer  $M_3^2$  im  $R_4$  und vor allem eine neue (zu der bekannten Konstruktion der Euklidischen Geraden-Kugeltransformation<sup>11)</sup> analoge) Konstruktion der Nichteuklidischen Geraden-Kugeltransformation<sup>12)</sup> und schließlich der Zusammenhang zwischen den beiden bisher völlig getrennt voneinander behandelten Begründungen der Geraden-Kugeltransformation in der Liniengeometrie und der Geometrie der komplexen Ebene.

---

<sup>9)</sup> In den Lieschen Abhandlungen werden die Resultate meist ohne Beweise angegeben. Die Beweise sind von F. Engel in den „Anmerkungen“ zu den Gef. Abh. analytisch nachgetragen worden. Dieselbe Aufgabe hatte sich L. Monville (Dissertation Gießen, 1922) gestellt.

<sup>10)</sup> E. A. Weiss, S. Lies erste Begründung der Geraden-Kugeltransformation, Math. Ann. 108, (1933), S. 621.

<sup>11)</sup> Vgl. R. Sturm, Die Gebilde ersten und zweiten Grades der Liniengeometrie in synthetischer Behandlung I, Leipzig 1892, S. 257, und die auf S. 51 angegebene Literatur. Ferner H. Liebmann, Sitzungsberichte Bayr. Akad. Wiss., Math.-phys. Klasse, 1915, S. 189.

<sup>12)</sup> Wegen der Ableitung der Konstruktion der Euklidischen Geraden-Kugeltransformation aus der komplexen Geometrie vgl. W. Brach, Zur Liebmannschen Konstruktion der G.-K.-T., Jahresber. der D. M. V., 44 (1934).

## BEGRÜNDUNG DER LIESCHEN ABBILDUNG.

## § 1. Die Grundlagen der Lieschen Abbildung.

1. S. Lies „Repräsentation“. Sind:

$$X = x + iy, Y = z + ip$$

die inhomogenen Koordinaten eines Punktes der komplexen Ebene, so deutet Lie die reellen Zahlen  $x, y, z$  als rechtwinklige <sup>13)</sup> Koordinaten eines Punktes in einem Raume  $R_3$ ,  $p$  als dessen Gewicht. Eine komplexe Gerade wird dann im allgemeinen durch eine „kotierte“ Ebene dargestellt; die Punkte gleichen Gewichtes liegen auf Geraden größter Neigung der Ebene. Die Linien, die von Punkten gleichen Gewichtes erfüllt werden, nennt Lie „Streifen“. Der Ort der Punkte mit dem Gewichte Null heißt „Nullstreifen“. Jede Gerade allgemeiner Lage des Bild- $R_3$  kann als Nullstreifen einer und nur einer Ebene angesehen werden und somit als Repräsentant der komplexen Geraden dienen.

Zu einer zweiten, von der ersten nicht wesentlich verschiedenen reellen Darstellung der komplexen Ebene gelangt Lie <sup>14)</sup>, indem er nicht von den Punkten, sondern von den Geraden der komplexen Ebene ausgeht. Er ordnet jeder der  $\infty^4$  komplexen Geraden allgemeiner Lage eine der  $\infty^4$  räumlichen Geraden zu durch die Vorschrift, daß er einer komplexen Geraden

$$BZ = X - A \text{ }^{15)} (B = b_1 + ib_2, A = a_1 + ia_2)$$

diejenige Raumgerade entsprechen läßt, deren inhomogene Plücker'sche Strahlenkoordinaten

$$a_1, a_2, b_1, b_2$$

sind. Diese Bildgerade fällt mit dem Nullstreifen der ersten Repräsentation zusammen.

Für die reellen Parallelen zur X-Achse tritt hier eine Besonderheit auf: als ihre Bilder erscheinen die Horizontalebenen des Bild- $R_3$ ; während die

<sup>13)</sup> Die  $(x, y)$ -Ebene sei horizontal, die  $z$ -Achse vertikal.

<sup>14)</sup> Gef. Abh. I, Nr. III, S. 26.

<sup>15)</sup> Wir schließen uns der Lie'schen Bezeichnungsweise an.

imaginären Parallelen zur X-Achse nur durch die uneigentliche Gerade der Horizontalebenen (deren Punkte kein bestimmtes Gewicht tragen) repräsentiert werden.

Die zweite Abbildung werden wir zum Ausgangspunkt unserer Untersuchung machen.

Lie gibt<sup>16)</sup> schließlich noch eine dritte Repräsentation an. Er geht wiederum von den Geraden der komplexen Ebene aus: Einer Geraden, deren Gleichung er in der Form:

$$TX + VZ = 1 \quad (T = t + iu, V = v + iw)$$

schreibt, bildet er ab durch die Ebene

$$tx + uy + vz - 1 = 0$$

vom Gewichte  $w$ .

Den Zusammenhang zwischen der dritten und der ersten Repräsentation hat Fr. Engel<sup>17)</sup> hergestellt.

2. Die Segresche Abbildung. C. Segre<sup>18)</sup> bildet den eigentlichen Punkt  $X$ ,  $Z$

$$X = x + iy, Z = z + ip$$

auf den reellen eigentlichen Punkt des  $R_4$  mit den Koordinaten

$$x, y, z, p$$

ab. Als Bilder der eigentlichen Geraden der komplexen Ebene erhält man dann  $\infty^4$  ausgezeichnete reelle Ebenen des  $R_4$  (Charakteristische Ebenen, bei Study<sup>19)</sup> Synektische Ebenen), die die Gaußschen Bilder der abgebildeten komplexen Geraden sind, soweit eigentliche Punkte der komplexen Geraden und der Bildebene in Frage kommen. Jede charakteristische Ebene trifft den uneigentlichen  $R_3$  des  $R_4$  in einer reellen Geraden, die als das Bild des uneigentlichen Punktes der komplexen Geraden angesehen werden muß. Durch eine solche reelle un-

<sup>16)</sup> Gef. Abh. 1, Nr. III, S. 30.

<sup>17)</sup> Anmerkungen zu den Gef. Abh. 1, S. 570.

<sup>18)</sup> Siehe S. 6 Anm. 7; ebenso auch C. Segre, Sulle varietà che rappresentano le coppie di punti di due piani o spazi, Palermo Rendiconti 5 (1891), S. 192.

<sup>19)</sup> Siehe S. 6, Anm. 7.

eigentliche Gerade laufen jedesmal  $\infty^2$  charakteristische Ebenen. Wir erhalten  $\infty^2$  derartig ausgezeichnete reelle uneigentliche Geraden, die einer elliptischen Geradenkongruenz angehören. Es sind die Bilder der  $\infty^2$  uneigentlichen Punkte der komplexen Ebene.

Die eben erwähnte elliptische Geradenkongruenz nennen wir im folgenden „absolute Kongruenz“; ihre beiden konjugiert-komplexen Leitgeraden seien mit  $\mathfrak{G}$  und  $\overline{\mathfrak{G}}$  bezeichnet. Die reellen Geraden der absoluten Kongruenz — die Bildgeraden der uneigentlichen Punkte der komplexen Ebene — nennen wir „absolute Geraden“. Eine charakteristische Ebene — Bild einer komplexen Geraden — schneidet die Leitgeraden  $\mathfrak{G}$  und  $\overline{\mathfrak{G}}$  der absoluten Kongruenz in den konjugiert-komplexen „absoluten Punkten“  $J$  und  $\overline{J}$  der Ebene.

Man kann nun nach Study<sup>20)</sup> genau so, wie man die Gaußsche Ebene durch einen uneigentlichen Punkt abschließt, auch die Gesamtheit der uneigentlichen Punkte einer charakteristischen Ebene als deren uneigentlichen Punkt bezeichnen. Aus dem Raume  $R_4$  entsteht dann ein Raum  $\mathcal{R}_4$ , der nur durch  $\infty^2$  uneigentliche Punkte abgeschlossen ist. Dem Inbegriff dieser  $\infty^2$  uneigentlichen Punkte kann dann noch der Name: uneigentliche charakteristische Ebene beigelegt werden. Dann entspricht jedem Punkte der komplexen Ebene ausnahmslos eindeutig ein Punkt im Raume  $\mathcal{R}_4$  und ebenso jeder Geraden der komplexen Ebene eine charakteristische Ebene. Wir werden von dieser Bezeichnungsweise Gebrauch machen, um Sätze des Raumes  $\mathcal{R}_4$  einfacher aussprechen zu können.

Für die bis hierher nur analytisch begründete Abbildung läßt sich eine einfache geometrische Konstruktion<sup>21)</sup> angeben. Wir denken uns dabei den Raum  $R_4$ , so wie wir es schon oben gelegentlich der Einführung der Geraden  $\mathfrak{G}$ ,  $\overline{\mathfrak{G}}$  getan haben, durch Hinzufügung imaginärer Punkte zu einem nun achtdimensionalen Punktkontinuum erweitert. In diesem komplexen  $R_4$  denken wir uns die (vierdimensionale) reelle Ebene  $\mathfrak{E}$  gelegen, deren Punkte auf die reellen Punkte des  $R_4$  abgebildet werden sollen.

Im uneigentlichen  $R_4$  des  $R_4$  nehmen wir eine hochimaginäre Gerade  $\mathfrak{G}$  an (d. i. eine Gerade, die zu ihrer konjugiert-komplexen Geraden  $\overline{\mathfrak{G}}$  windschief ist), die die Ebene  $\mathfrak{E}$  nicht schneidet. Wir verbinden nun den abzubildenden Punkt  $P$  der Ebene  $\mathfrak{E}$  durch eine Ebene mit der Geraden  $\mathfrak{G}$ .

<sup>20)</sup> Siehe S. 6, Anm. 7.

<sup>21)</sup> Siehe S. 6, Anm. 7.

Die zur Ebene  $P\mathfrak{G}$  konjugiert-komplexe Ebene durch  $\overline{\mathfrak{G}}$  trifft die Ebene  $P\mathfrak{G}$  in ihrem reellen Punkte. Als Bild eines Punktes  $P$  soll im allgemeinen dieser reelle Punkt dienen.

Singularitäten ergeben sich für die Punkte der uneigentlichen Geraden der komplexen Ebene  $\mathfrak{G}$ . Die Verbindungsebene eines solchen Punktes mit  $\mathfrak{G}$  und die zu ihr konjugiert-komplexe Ebene durch  $\overline{\mathfrak{G}}$  schneiden sich in einer reellen Treffgeraden der von  $\mathfrak{G}$  und  $\overline{\mathfrak{G}}$  aufgespannten (elliptischen) Kongruenz, also — unter Benutzung der oben eingeführten Terminologie — in einer absoluten Geraden der absoluten Kongruenz.

Einer eigentlichen Geraden der komplexen Ebene entspricht in dieser Abbildung eine Ebene, die Schnittebene ihres Verbindungs- $R_3$  mit  $\mathfrak{G}$  und des dazu konjugiert-komplexen  $R_3$  (durch  $\overline{\mathfrak{G}}$ ), also eine charakteristische Ebene des Bild- $R_4$ . Der uneigentlichen Geraden der komplexen Ebene ist der Inbegriff der absoluten Geraden des uneigentlichen  $R_3$  des Bild- $R_4$  zugeordnet.

3. Herleitung der Liefchen Abbildung aus der Segreschen. Wir stellen jetzt den Zusammenhang zwischen der Segreschen und der zweiten Liefchen Abbildung her. Dies geschieht dadurch, daß im Segreschen Bild- $R_4$  ( $x, y, z, p$ ) der Raum

$$p = 0$$

als Liefcher Bild- $R_3$  ausgezeichnet wird. Die zweite <sup>22)</sup> Liefche Abbildung erhält man dann, indem man die Bildfiguren der Segreschen Abbildung mit dem Liefchen  $R_3$  zum Schritt bringt. Dieses Verfahren werden wir jetzt, ohne die analytische Begründung weiter zu benutzen, rein synthetisch zur Anwendung bringen. Wir denken uns den Segreschen  $R_4$  nach der in der vorigen Nummer auseinandergesetzten Methode konstruiert. Der Liefche Bild-Raum ist ein beliebiger reeller eigentlicher Raum dieses  $R_4$ , der die Ebene  $\mathfrak{G}$  enthält. Er hat — wie jeder eigentliche reelle  $R_3$  des  $R_4$  — mit der absoluten Kongruenz eine absolute Gerade  $\mathfrak{P}$ , die Verbindungslinie der Punkte  $J, \bar{J}$ , in denen  $\mathfrak{G}, \overline{\mathfrak{G}}$  den  $R_3$  schneiden, gemein. Die durch die absolute Gerade  $\mathfrak{P}$  laufenden reellen Ebenen des Liefchen-

<sup>22)</sup> Die erste Liefche Abbildung der Nr. 1 ergibt sich als kotierte Projektion des Segreschen  $R_4$  von dem uneigentlichen Punkte der  $p$ -Achse aus; die dritte als kotierter Schnitt aus der zur Segreschen Abbildung dualen Abbildung.

$R_3$  sind somit charakteristische Ebenen, und zwar sind es die einzigen charakteristischen Ebenen des Lieschen  $R_3$ . Wir wollen sie Horizontalebene nennen.

Die Gerade  $\mathfrak{P}$  schneidet die Ebene  $\mathfrak{E}$  in einem Punkte, den wir (wieder um mit der Lieschen Bezeichnung im Einklang zu bleiben) als uneigentlichen Punkt der X-Achse der Ebene  $\mathfrak{E}$  bezeichnen. Dann folgt erstens, daß die absolute Gerade  $\mathfrak{P}$  des Lieschen- $R_3$  Bild des uneigentlichen Punktes der X-Achse ist, zweitens, daß die Horizontalebenen Bildebenen von Parallelen zur X-Achse sind. Da diese charakteristischen Ebenen außerdem den reellen Zug der abzubildenden Ebene  $\mathfrak{E}$  in reellen Parallelen zur X-Achse schneiden, sind die betrachteten charakteristischen Ebenen (Horizontalebenen) Bildebenen der reellen Parallelen zur X-Achse.

Die imaginären Parallelen zur X-Achse haben zu Bildern im Segreschen- $R_4$  die übrigen, durch die absolute Gerade  $\mathfrak{P}$  des Lieschen  $R_3$  laufenden, aber diesem  $R_3$  nicht angehörigen charakteristischen Ebenen. Sie schneiden den Lieschen- $R_3$  also nur in seiner absoluten Geraden  $\mathfrak{P}$ , die somit als Repräsentant zugleich aller imaginären Parallelen zur X-Achse auftritt.

Jede nicht zur X-Achse parallele Gerade der komplexen Ebene hat als Bildebene in der Segreschen Abbildung eine charakteristische Ebene, die nicht durch  $\mathfrak{P}$  hindurchläuft, den Lieschen- $R_3$  somit in einer eigentlichen reellen Geraden schneidet, die nicht einer Horizontalebene angehört.

Umgekehrt gibt es zu jeder solchen Geraden eine und nur eine charakteristische Ebene, die durch sie hindurchläuft; denn jede eigentliche reelle Gerade des  $R_4$  (und also auch des Lieschen- $R_3$ ) trifft den uneigentlichen  $R_3$  des  $R_4$  in einem reellen Punkte, durch den eine und nur eine absolute Gerade hindurchläuft. Diese spannt zusammen mit der Ausgangsgeraden die charakteristische Ebene auf.

Abbildung eines Punktes der komplexen Ebene: Geht man nun daran, Figuren der Ebene  $\mathfrak{E}$  abzubilden, so hat man diese als Geradenörter aufzufassen.

Die Gesamtheit der durch einen reellen, dem Lieschen- $R_3$  nicht angehörigen, eigentlichen Punkt  $p$  des Segreschen- $R_4$  laufenden charakteristischen Ebenen schneidet den Lieschen- $R_3$  in Geraden einer linearen Kongruenz. Leitgeraden dieser (elliptischen) Kongruenz sind diejenigen kon-

jugiert-komplexen Geraden des Lieschen- $R_3$ , in die die Geraden  $\mathfrak{G}$  und  $\overline{\mathfrak{G}}$  vom Punkte  $p$  aus projiziert werden. Sie laufen demnach durch die Punkte  $J, \overline{J}$ . Der Einfachheit der Bezeichnung wegen setzen wir voraus, daß der die Euklidische Metrik des Lieschen- $R_3$  bestimmende „Absolute Kegelschnitt“ die Punkte  $J$  und  $\overline{J}$  enthält. Die Leitgeraden der Bildkongruenz sind dann Minimalgeraden. Diese beiden Minimalgeraden haben eine gemeinsame reelle Senkrechte, und diese verläuft, weil die Minimalgeraden Horizontalebenen angehören, vertikal. Eine Rotation um diese gemeinsame Senkrechte als Achse läßt die ganze Kongruenz in Ruhe; es handelt sich daher um eine Rotationskongruenz.

Die durch einen eigentlichen Punkt des Lieschen- $R_3$  laufenden charakteristischen Ebenen schneiden den Lieschen- $R_3$  in Geraden eines Geradenbündels, dessen Scheitel der vorgegebene Punkt ist.

Eine nicht im Bild- $R_3$  gelegene absolute Gerade ist Träger von  $\infty^2$  charakteristischen Ebenen, die aus dem Lieschen- $R_3$  ein Parallelenbündel ausschneiden.

Die durch die absolute Gerade  $\mathfrak{P}$  des Lieschen- $R_3$  laufenden charakteristischen Ebenen haben wir bereits betrachtet. Wir stellen zusammen:

| Komplexe Ebene                                                                                           | Segrescher- $R_4$                                          | Liescher- $R_3$                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Gerade allgemeiner Lage                                                                                  | Charakteristische Ebene                                    | Gerade allgemeiner Lage                            |
| Reelle Parallele zur X-Achse                                                                             | Charakteristische Ebene durch $\mathfrak{P}$               | Horizontalebene                                    |
| Imaginäre Parallele zur X-Achse                                                                          | Charakteristische Ebene durch $\mathfrak{P}$               | Gerade $\mathfrak{P}$                              |
| Uneigentliche Gerade                                                                                     | Uneigentlicher $R_3$ (als Ort der absol. Geraden)          | Uneigentliche Ebene                                |
| Punkt allgemeiner Lage (als Ort von Geraden)                                                             | Punkt allgem. Lage (als Ort von charakteristischen Ebenen) | Rotationskongruenz                                 |
| Punkt auf einer reellen Parallelen zur X-Achse                                                           | Punkt des Lieschen $R_3$                                   | Geradenbündel                                      |
| Uneigentlicher Punkt allgemeiner Lage                                                                    | Absolute Gerade                                            | Parallelenbündel                                   |
| Uneigentlicher Punkt $P$ (= uneigentlicher Punkt der X-Achse) als Ort von reellen Parallelen zur X-Achse | Absolute Gerade $\mathfrak{P}$                             | Gerade $\mathfrak{P}$ als Ort von Horizontalebenen |

Wir haben hiermit gezeigt, wie sich die Lie'schen Bilder von Geraden und Punkten der komplexen Ebene aus den Segre'schen Bildfiguren durch Schnitt gewinnen lassen. Wir werden in den folgenden Paragraphen darangehen, andere Gebilde der komplexen Ebene zunächst im Segre'schen- $R_4$  abzubilden und ihre Bildfiguren mit dem Lie'schen- $R_3$  zum Schnitt zu bringen.

## § 2. Der komplexe Kegelschnitt.

4. Bild einer Kurve zweiter Ordnung im Segre'schen  $R_4$ . Die Bildfläche  $\Gamma$ . Wir denken uns die Ebene  $\mathcal{C}$  — wie bereits erwähnt — im Bild- $R_4$  gelegen und bilden sie nach dem Segre'schen Verfahren punktweise auf die reellen Punkte des reellen  $R_4$  ab: Wir verbinden insbesondere jeden Punkt  $X$  des komplexen Kegelschnitts  $C^{23)}$  durch eine Ebene mit der Leitgeraden  $\mathcal{G}$ . So erhalten wir einen quadratischen Zylinder  $k$  vom Range 3, dessen Scheitelgerade die uneigentliche Gerade  $\mathcal{G}$  ist. Die zu den Ebenen dieses Zylinders konjugiert-komplexen Ebenen erfüllen den konjugiert-komplexen Zylinder  $\bar{k}$ , dessen Scheitelgerade die zu  $\mathcal{G}$  konjugiert-komplexe Gerade  $\bar{\mathcal{G}}$  ist. Die beiden konjugiert-komplexen Zylinder  $k, \bar{k}$ , schneiden sich in einer reellen Mannigfaltigkeit  $F_2^4$ .

Zwei  $M_3^2$  des  $R_4$  spannen ein Büschel von  $M_3^2$  auf, die eine Basismannigfaltigkeit  $F_2^4$  gemein haben. Dies Büschel wird im allgemeinen Falle fünf Kegel vom Range 4 enthalten. Insbesondere spannen aber zwei Kegel vom Range 3 ein Büschel von  $M_3^2$  auf, das außer diesen beiden Kegeln vom Range 3 nur noch einen Kegel vom Range 4 <sup>24)</sup> enthält. Die Basismannigfaltigkeit  $F_2^4$  bezeichnen wir in diesem Falle mit  $\Gamma$ .

Bild eines zentrischen Kegelschnitts  $C$  im Segre'schen  $R_4$  ist der reelle Zug einer Fläche  $\Gamma$ .

Den eigentlichen komplexen Punkten des Kegelschnitts  $C$  entsprechen die eigentlichen reellen Punkte von  $\Gamma$ . Die Fläche  $\Gamma$  schneidet den un-

<sup>23)</sup> Von dem abzubildenden Kegelschnitt  $C$  setzen wir zunächst voraus, daß er regulär sei und die uneigentliche Gerade in zwei verschiedenen Punkten schneide.

<sup>24)</sup> Durch Projektion von  $\Gamma$  auf einen  $R_3$  entsteht eine Dupin'sche Zyklide. Der Fläche  $\Gamma$  entspricht die Charakteristik  $[(11)(11)1]$ , vgl. C. Segre: Surfaces du 4<sup>e</sup> ordre à conique double, Math. Ann. **24** (1884) S. 313.

eigentlichen  $R_3$  in einem dem Geradenpaar  $\mathfrak{G}, \overline{\mathfrak{G}}$  einbeschriebenen reellen Vierseit, dessen Eckpunkte die vier Doppelpunkte von  $\Gamma$  sind. Zwei Seiten dieses Vierseits sind konjugiert-komplex, die beiden anderen reell und somit absolute Geraden. Diese beiden absoluten Geraden sind die Bilder der uneigentlichen Punkte des Kegelschnitts  $C$ .

Wir betrachten jetzt den Fall der Parabel. Berührt der komplexe Kegelschnitt  $C$  die uneigentliche Gerade, so berührt auch der konjugiert-komplexe Kegelschnitt  $\overline{C}$  die uneigentliche Gerade. Die  $C$  und  $\overline{C}$  von  $\mathfrak{G}$  und  $\overline{\mathfrak{G}}$  aus projizierenden Zylinder  $k, \overline{k}$  haben somit einen Berührungspunkt  $R_3$  gemeinsam: den uneigentlichen  $R_3$  des Bild- $R_4$ . Insbesondere ist dann die Leitgerade  $\mathfrak{G}$  Tangente an den Zylinder  $\overline{k}$  und die Leitgerade  $\overline{\mathfrak{G}}$  Tangente an den Zylinder  $k$ . Die beiden Doppelpunkte  $p, q$ , in denen  $\mathfrak{G}$  im allgemeinen Falle den Zylinder  $k$  schneidet, fallen somit in einen einzigen Punkt  $t$  zusammen, ebenso die auf  $\overline{\mathfrak{G}}$  gelegenen Doppelpunkte  $r, s$  in den zu  $t$  konjugiert-komplexen Punkt  $\overline{t}$ . Die vier Geraden der Fläche  $\Gamma$  fallen daher in eine einzige reelle Gerade,  $t\overline{t}$ , zusammen<sup>25</sup>).

Die Bildfläche einer komplexen Parabel besitzt im Uneigentlichen eine (vierfach zählende) absolute Gerade, das Bild des einzigen uneigentlichen Punktes der Parabel.

| Komplexe Ebene                       | Segrescher- $R_4$                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zentrischer Kegelschnitt             | Reeller Zug einer Fläche $F_2^4$ mit uneigentlichem, den geraden $\mathfrak{G}, \overline{\mathfrak{G}}$ einbeschriebenen Vierseit. |
| Eigentlicher Punkt des Kegelschnitts | Reeller eigentlicher Punkt der $F_2^4$ .                                                                                            |
| Uneigentlicher Punkt                 | Absolute Gerade der $F_2^4$ .                                                                                                       |
| Parabel                              | Reeller Zug einer Fläche $F_2^4$ mit vierfachzählender uneigentlicher Geraden.                                                      |
| Eigentlicher Punkt der Parabel       | Reeller eigentlicher Punkt der $F_2^4$ .                                                                                            |
| Uneigentlicher Punkt                 | Absolute Gerade der $F_2^4$ .                                                                                                       |

<sup>25</sup> Das Büschel der  $M_3^2$  besteht jetzt ganz aus Kegeln, die von demselben  $R_3$  (dem uneigentlichen  $R_3$ ) längs der Geraden  $t\overline{t}$  berührt werden. Unter diesen Kegeln befinden sich zwei Kegel vom Range 3: die Zylinder  $k, \overline{k}$ . Ihre Durchschnittsfläche kann auch als Projektion einer Veronesischen  $V_2^4$  des  $R_5$  von einem Punkte der Ebene einer  $C^2$  dieser  $V_2^4$  aus aufgefaßt werden.

Wir werden den Kegelschnitt  $C$  im folgenden stillschweigend als zentrisch voraussetzen und nur dort, wo es erforderlich erscheint, auf die Parabel besonders eingehen.

5. Das Polarsystem der Fläche  $\Gamma$  als Bild des Polarsystems des Kegelschnitts  $C$ . Wir haben bereits erwähnt, daß die beiden, die Kegelschnitte  $C, \bar{C}$  der komplexen Ebene projizierenden Zylinder  $k, \bar{k}$  ein  $M_3^2$ -Büschel aufspannen. Mit einem solchen  $M_3^2$ -Büschel, oder — wie wir auch sagen können — mit der Basismannigfaltigkeit  $F_2^4$ , läßt sich ein Polarsystem verbinden.

Irgendein eigentlicher reeller Punkt  $p$  des  $R_4$  hat inbezug auf die beiden konjugiert-komplexen Zylinder  $k, \bar{k}$  zwei konjugiert-komplexe Polar- $R_3$ , die sich im allgemeinen in einer reellen Ebene  $g$  schneiden. Wir wollen sie die Polarebene  $g$  des Punktes  $p$  inbezug auf die Fläche  $\Gamma$  nennen. Diese so gewonnene reelle Polarebene ist eine charakteristische Ebene, denn die beiden Polar- $R_3$  enthalten  $\mathcal{G}$  und  $\bar{\mathcal{G}}$ , ihre Schnittebene schneidet daher jede der beiden Geraden.

Gehört der reelle Punkt  $p$  dem uneigentlichen  $R_3$  des  $R_4$  an, so läuft durch ihn eine einzige absolute Gerade. Alle Punkte dieser absoluten Geraden gehören derselben Ebene durch  $\mathcal{G}$  (bzw.  $\bar{\mathcal{G}}$ ) an; ihnen entspricht somit derselbe Polar- $R_3$  inbezug auf  $k$  (bzw.  $\bar{k}$ ). So folgt, daß allen Punkten der absoluten Geraden dieselbe Polarebene entspricht. Jeder absoluten Geraden der absoluten Kongruenz wird also in unserem Polarsystem eine charakteristische Ebene zugeordnet.

Im Sonderfall können aber die beiden Polar- $R_3$  zusammenfallen. Dies geschieht für den Scheitel  $m$  des dem Büschel angehörigen Kegels vom Range 4. In der Tat, denkt man sich das  $M_3^2$ -Büschel von diesem Kegel und einer anderen  $M_3^2$  des Büschels aufgespannt, und konstruiert man den Polar- $R_3$  des Punktes  $m$  inbezug auf alle  $M_3^2$ , so muß dieser  $R_3$  für sämtliche  $M_3^2$  identisch ausfallen, weil der Polar- $R_3$  inbezug auf den Kegel vom Range 4 unbestimmt wird. Als Polar- $R_3$  inbezug auf  $k$  und  $\bar{k}$  muß der gefuchte Polarraum  $\mathcal{G}$  und  $\bar{\mathcal{G}}$  enthalten, und ist daher der uneigentliche  $R_3$  des  $R_4$ .

Legen wir jetzt wieder den absoluten Geraden die Bezeichnung: „uneigentliche Punkte“, dem uneigentlichen  $R_3$  die Bezeichnung: „uneigentliche charakteristische Ebene“ bei, so haben wir eine eindeutig umkehrbare, involutorische Verwandtschaft zwischen Punkten und charakteristischen Ebenen des Bild- $R_4$

konstruiert, von der wir behaupten, daß sie in unserer Abbildung der komplexen Ebene  $\mathbb{C}$  auf den reellen  $R_4$  das Bild des mit dem Kegelschnitt  $C$  verbundenen Polarsystems ist.

Dies wollen wir jetzt zeigen: Der reelle Punkt  $x$  des  $R_4$  ist Bild eines Punktes  $X$  der komplexen Ebene, den wir erhalten, wenn wir  $x$  durch eine Ebene mit  $\mathbb{G}$  verbinden und mit der Ebene  $\mathbb{C}$  zum Schnitt bringen. Der Polar- $R_3$  des Punktes  $x$  in bezug auf den Zylinder  $k$  schneidet  $\mathbb{C}$  in einer Geraden  $G$ , die mit der Polaren des Punktes  $P$  in bezug auf den komplexen Kegelschnitt  $C$  identisch ist. Der Polar- $R_3$  des Punktes  $x$  in bezug auf  $k$  ist konjugiert-komplex zu dem Polar- $R_3$  in bezug auf  $\bar{k}$ . Folglich ist die (charakteristische) Schnittebene  $g$  der beiden Polar- $R_3$  Segresches Bild der Polargeraden  $G$  des Punktes  $X$  in bezug auf  $C$ , w. z. b. w.

Da, wie wir bereits sahen, der Scheitel  $m$  des Kegels vom Range 4 Pol des uneigentlichen  $R_3$  in bezug auf die Fläche  $\Gamma$  ist, ist dieser Scheitel Bildpunkt des Mittelpunktes des Kegelschnitts  $C$ .

|                                                          |                                                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Polarität am Kegelschnitt $C$<br>Mittelpunkt $M$ von $C$ | Polarsystem der Fläche $\Gamma$<br>Scheitel $m$ des Kegels vom<br>Range 4. |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

**6. Die reellen Tangentialebenen von  $\Gamma$  — Bilder der Geraden der zugehörigen Kurve 2. Klasse.** Gehört der eigentliche reelle Punkt  $x$  der Fläche  $\Gamma$  selbst an, so wird aus der Polarebene die Tangentialebene in diesem Punkte:

Da nämlich der Punkt  $x$  der Fläche  $\Gamma$  angehört, gehört er auch den Kegeln  $k$  und  $\bar{k}$  an. Als Punkt des Kegels  $k$  wird ihm in dem mit dem Kegel  $k$  verbundenen Polarsystem der Berührungs- $R_3$  durch diesen Punkt an den Kegel  $k$  zugeordnet; als Punkt des Kegels  $\bar{k}$  entspricht ihm der konjugiert-komplexe  $R_3$ . Diese beiden  $R_3$  schneiden sich in einer (charakteristischen) Tangentialebene von  $\Gamma$ . Diese ist somit das Bild einer Tangente des komplexen Kegelschnitts.

Umgekehrt ist jede reelle Tangentialebene charakteristisch<sup>26)</sup> und Bild einer Tangente des Kegelschnitts  $C$ .

<sup>26)</sup> Eine Fläche, von der jede Tangentialebene charakteristisch ist, heißt selbst charakteristisch (bei Study: synektisch). Unsere Fläche  $\Gamma$  ist daher eine charakteristische Fläche.

Es bleibt nun noch der Fall zu untersuchen, daß der reelle Punkt  $p$ , dessen Polarmannigfaltigkeit in bezug auf  $\Gamma$  gefunden werden soll, auf einer der absoluten Geraden der Fläche  $\Gamma$  liegt. Es zeigt sich, daß allen Punkten der absoluten Geraden ein und dieselbe (charakteristische) Tangentialebene entspricht, die Verbindungsebene der absoluten Geraden mit dem Punkte  $m$ .

|                                               |                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tangente in einem eigentlichen Punkte $X$     | (Charakteristische) Tangentialebene der Fläche $\Gamma$ im Bildpunkte $x$ .                |
| Asymptote des zentrischen Kegelschnitts $C$ . | (Charakteristische) Verbindungsebene einer absoluten Geraden der Fläche $\Gamma$ mit $m$ . |

Wir fügen hinzu, daß im Falle einer Parabel der einzigen absoluten Geraden von  $\Gamma$  der uneigentliche  $R_3$  des  $R_4$  zugeordnet wird. Unter Verwendung der Study'schen Terminologie wird daher der Kegelschnitt als Ort von Geraden auf die Fläche  $\Gamma$  als Ort ihrer reellen Tangentialebenen abgebildet.

7. Bild eines Kegelschnitts im Liefchen Bild- $R_3$ . In dieser Nummer bringen wir die als Bild eines regulären Kegelschnitts erhaltene charakteristische Fläche  $\Gamma$  als Ort von Punkten und Tangentialebenen mit dem Liefchen Bild- $R_3$  zum Schnitt.

Als Schnitt des Punktortes — also als Liefches Bild (Nullstreifen) der abgebildeten Kurve 2. O. — erhalten wir im allgemeinen eine reelle Raumkurve 4. O., und zwar eine elliptische Kurve, da sie sich als vollständiger Durchschnitt der beiden quadratischen Minimalzylinder  $\mathcal{R}, \bar{\mathcal{R}}$  ergibt, in denen die „Hyperzylinder“  $k, \bar{k}$  den Liefchen- $R_3$  schneiden. Je nach der Lage der Bildfläche  $\Gamma$  zum Liefchen- $R_3$  können Ausartungen eintreten, die wir nacheinander aufführen werden.

Als Schnitt des Ebenenortes — also als Liefches Bild der Kurve 2. Klasse — ergibt sich eine Linienkongruenz. Der Liefche  $R_3$  schneidet die beiden Hyperzylinder  $k, \bar{k}$ , wie wir bereits sagten, in den beiden quadratischen Minimalzylindern  $\mathcal{R}, \bar{\mathcal{R}}$ . Die beiden zu einer Tangentialebene  $t$  gehörigen Berührungs- $R_3$  der Hyperzylinder  $k, \bar{k}$  schneiden nun den Liefchen  $R_3$  in zwei ebenfalls konjugiert-komplexen Berüh-

rungsebenen der Minimalzylinder  $\mathfrak{R}$ ,  $\overline{\mathfrak{R}}$ . Diese beiden Berührungsebenen schneiden sich in einer reellen Geraden  $\mathfrak{T}$ , der Schnittgeraden der Tangentialebene  $\tau$  von  $\Gamma$  mit dem Liefchen- $R_3$ . Diese ist mithin das Liefche Bild einer Tangente  $T$  des komplexen Kegelschnitts. Das System der Tangenten des komplexen Kegelschnitts wird daher auf das System der gemeinsamen, reellen Tangenten der beiden Minimalzylinder  $\mathfrak{R}$ ,  $\overline{\mathfrak{R}}$ , also im allgemeinen auf den reellen Zug einer Linienkongruenz  $(4, 4)$  abgebildet. Je nach der Lage der Fläche  $\Gamma$  zum Liefchen- $R_3$  treten Ausartungen dieser Kongruenz auf. Wir bringen im folgenden eine vollständige Klassifikation aller möglichen Fälle, zusammen mit der Klassifikation der Nullstreifen:

## I. Zentrische Kurven.

Der Bildfläche  $\Gamma$  gehören zwei verschiedene absolute Geraden an.

a) Kegelschnitt, der nicht durch den uneigentlichen Punkt der  $X$ -Achse läuft.

Keine der absoluten Geraden von  $\Gamma$  fällt mit der absoluten Geraden  $\mathfrak{P}$  des Liefchen- $R_3$  zusammen.

Dann sind vom uneigentlichen Punkt der  $X$ -Achse zwei Tangenten an den Kegelschnitt möglich, d. h. durch die Gerade  $\mathfrak{P}$  laufen zwei reelle Tangentialebenen an die Fläche  $\Gamma$ . Wir unterscheiden:

### 1. Die beiden Tangenten sind imaginär.

Die beiden Tangentialebenen durch  $\mathfrak{P}$  gehören dem Liefchen- $R_3$  nicht an. (Allgemeiner Fall.)

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elliptische $C^4$ ; [1111] | Kongruenz $(4, 4)$ der gemeinsamen Tangenten zweier Minimalzylinder allgemeiner Lage. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

### 2. Eine der beiden Tangenten ist reell, die andere ist imaginär.

Eine der beiden Tangentialebenen durch  $\mathfrak{P}$  gehört dem Liefchen- $R_3$  an.

$C^4$  mit eigentlichem Doppelpunkt;  $[211]$

Horizontalebene<sup>27</sup>) und Kongruenz  $(4, 3)$  der gemeinsamen Tangenten zweier Minimalzylinder, die die Horizontalebene als gemeinsame Berührungsebene haben.

### 3. Beide Tangenten sind reell.

Beide Tangentialebenen durch  $\mathfrak{P}$  gehören dem Lieschen- $R_3$  an.

Zwei Kurven 2. O.;  $[(11) 11]$ .

Zwei Horizontalebenen<sup>27</sup>) und Kongruenz  $(4, 2)$  der gemeinsamen Tangenten zweier Minimalzylinder, die die beiden Horizontalebenen als gemeinsame Berührungsebenen haben.

b) Kegelschnitt, der den uneigentlichen Punkt der X-Achse enthält.

Eine der absoluten Geraden der Fläche  $\Gamma$  fällt mit der absoluten Geraden  $\mathfrak{P}$  des Lieschen- $R_3$  zusammen.

#### 1. Die zur X-Achse parallele Asymptote ist imaginär.

Kubischer Kreis und die Gerade  $\mathfrak{P}$ ;  $[2, 2]$

Kongruenz  $(4, 4)$  der gemeinsamen Tangenten zweier Minimalzylinder mit der gemeinsamen Erzeugenden  $\mathfrak{P}$ .

#### 2. Die zur X-Achse parallele Asymptote ist reell.

<sup>27</sup> Die Horizontalebene stellt als Ganzes das Bild einer reellen Parallelen zur X-Achse dar.

Kegelschnitt und die Gerade  $\mathfrak{P}$  doppeltgezählt <sup>29</sup>).

Horizontalebene <sup>28</sup>) und Kongruenz (4, 2) der gemeinsamen Tangenten zweier Minimalzylinder, die sich längs  $\mathfrak{P}$  berühren, mit der Horizontalebene als Berührungsebene <sup>28</sup>).

## II. Parabeln.

a) Der uneigentliche Punkt der Parabel ist verschieden von dem uneigentlichen Punkt der X-Achse.

1. Die zur X-Achse parallele Tangente ist imaginär.

$C^4$  mit uneigentlichem Doppelpunkt; [2 11]

Uneigentliche Ebene <sup>30</sup>) und Kongruenz (4, 3) der gemeinsamen Tangenten zweier Minimalzylinder, mit der uneigentlichen Ebene als gemeinsamer Berührungsebene <sup>30</sup>).

2. Die zur X-Achse parallele Tangente ist reell.

Zwei Parabeln; [(11) 11].

Uneigentliche Ebene <sup>30</sup>), Horizontalebene und Kongruenz (4, 2) der gemeinsamen Tangenten zweier Minimalzylinder mit den beiden Ebenen als gemeinsamen Berührungsebenen.

b) Die Parabel berührt die uneigentliche Gerade im uneigentlichen Punkte der X-Achse.

<sup>28</sup> Die horizontale Berührungsebene ist Bild der Asymptote.

<sup>29</sup> Es liegt hier ein Büschel von Kegeln vor, wobei die Kegelschnittebene zusammen mit der gemeinsamen Berührungsebene den einzigen Kegel vom Range 2 darstellen.

<sup>30</sup> Die uneigentliche Ebene tritt als Bild der uneigentlichen Geraden auf.

Parabel und die Gerade  $\mathfrak{P}$  doppeltgezählt.<sup>31)</sup>

Uneigentliche Ebene und Kongruenz (4, 2) der gemeinsamen Tangenten zweier Minimalzylinder, die sich längs  $\mathfrak{P}$  berühren und die uneigentliche Ebene als gemeinsame Berührungsebene haben.

**8. Pol und Polare im Liefchen  $R_3$ .** Wir haben in Nr. 5 angegeben, wie man zu einem beliebigen Punkte des Bild- $R_4$  diejenige charakteristische Ebene — Polarebene des Punktes in bezug auf  $\Gamma$  — konstruieren kann, die die Polare des entsprechenden Punktes der komplexen Ebene in bezug auf den Kegelschnitt  $C$  der komplexen Ebene darstellt. Die (charakteristischen) Polarebenen schneiden den Liefchen- $R_3$  in Geraden, die wir als „Polargeraden“ bezeichnen.

**Polargeraden der Punkte des Liefchen  $R_3$ :** Die Konstruktion<sup>32)</sup> der Polargeraden von Punkten, die insbesondere dem Liefchen- $R_3$  angehören, ergibt sich aus der Konstruktion der entsprechenden Polarebenen im Bild- $R_4$ : Wir konstruieren die Polarebenen (im gewöhnlichen Sinne) des Punktes in bezug auf die beiden Minimalzylinder  $\mathfrak{R}$ ,  $\overline{\mathfrak{R}}$  und bringen die beiden (konjugiert-komplexen) Polarebenen zum Schnitt. Die (reelle) Schnittlinie ist die gesuchte Polargeade<sup>32)</sup>.

Den  $\infty^3$  Punkten des Liefchen- $R_3$  entsprechen so  $\infty^3$  Polargeraden, die einen Linienkomplex erfüllen. Diesen wollen wir näher untersuchen. Wir gehen dabei auf den Segreschen  $R_4$  zurück.

Ein Satz von C. Segre<sup>34)</sup> besagt: Die Pole eines  $R_3$  allgemeiner Lage (insbesondere also auch des Liefchen- $R_3$ ) in bezug auf die  $\infty^1 M_3^2$  eines

<sup>31)</sup> Siehe S. 21, Anm. 29.

<sup>32)</sup> Man vgl. S. Lie, Gef. Abh. 1, Nr. IV, § 25 (S. 41).

<sup>33)</sup> Diese Gerade kann natürlich auch als Polare des Punktes in bezug auf das durch die beiden Minimalzylinder  $\mathfrak{R}$ ,  $\overline{\mathfrak{R}}$  aufgespannte Büschel von Flächen 2. O. bezeichnet werden.

<sup>34)</sup> Vgl. etwa F. Bertini-A. Dufschek, Einführung in die projektive Geometrie mehrdimensionaler Räume, Seidel, Wien 1924, S. 165 ff.

Büfchels bilden eine rationale Normal- $C^4$ . Die Trifekantenebenen dieser  $C^4$  sind die Polarebenen der Punkte des  $R_3$  inbezug auf das Büfchel.

Ist die Basismannigfaltigkeit  $F_2^4$  des Büfchels die Bildfläche  $\Gamma$  eines komplexen Kegelschnitts  $C$ , so zerfällt die  $C^4$ , und zwar in die Geraden  $\mathfrak{G}$  und  $\overline{\mathfrak{G}}$  und einen  $\mathfrak{G}$  und  $\overline{\mathfrak{G}}$  treffenden Kegelschnitt, also einen Kreis:  $\mathfrak{H}$ ; denn die  $C^4$  muß als Ort der Pole des  $R_3$  inbezug auf alle  $M_3^2$  des Büfchels insbesondere die Geraden  $\mathfrak{G}$  und  $\overline{\mathfrak{G}}$  enthalten.

Die den Punkten des Liefchen- $R_3$  entsprechenden Polarebenen inbezug auf die Schnittfläche  $\Gamma$  sind demnach die Treffebenen der Geraden  $\mathfrak{G}$  und  $\overline{\mathfrak{G}}$  und eines in einer charakteristischen Ebene gelegenen Kreises  $\mathfrak{H}$ , m. a. W. die charakteristischen Treffebenen von  $\mathfrak{H}$ .

Diese Ebenenmannigfaltigkeit ist nun mit dem Liefchen- $R_3$  zum Schnitt zu bringen. Die Sekantenebenen einer Normalkurve 4. O. des  $R_4$  schneiden nun einen  $R_3$  in Geraden eines tetraedralen Komplexes<sup>35</sup>). Insbesondere schneiden auch die Sekantenebenen unserer zerfallenden  $C^4$  den Liefchen  $R_3$  in Geraden eines solchen Komplexes. (Beweis für diesen Sonderfall siehe auch S. 36.) Die Schnittpunkte der  $C^4$  mit dem  $R_3$  sind die Ecken des Haupttetraeders dieses Komplexes. Diese Eckpunkte können wir unmittelbar angeben. Es sind erstens: die Punkte  $J$  und  $\overline{J}$ , zweitens die Schnittpunkte  $s_1, s_2$  des Kreises  $\mathfrak{H}$  mit dem Liefchen- $R_3$ , die sowohl beide reell sein, oder zusammenfallen, oder konjugiert-komplex sein können<sup>36</sup>).

Tetraedrale Komplexe, bei denen zwei Hauptpunkte in den absoluten Kegelschnitt fallen, heißen nach F. Rulf<sup>37</sup>) zyklisch. Damit haben wir das gesuchte Resultat:

Die Polargeraden der Punkte des Liefchen- $R_3$  erfüllen einen zyklisch-tetraedralen Komplex.

Wir untersuchen jetzt die im zyklisch-tetraedralen Komplex enthaltenen Kongruenzen und Reguli von Polargeraden, die den Punkten einer Ebene und einer Geraden des Liefchen- $R_3$  entsprechen.

Polargeraden der Punkte einer Ebene des Liefchen Bild- $R_3$ :

a) Ebenen allgemeiner Lage: Ein zyklisch-tetraedraler Komplex enthält die Bifekantenkongruenzen von  $\infty^3$  kubischen Raumkurven.

<sup>35</sup> A. Carronne, Rend. Acc. Napoli (3), 7, (1901), S. 57—66.

<sup>36</sup> Sonderfälle findet man in Nr. 15 der vorliegenden Arbeit behandelt.

<sup>37</sup> F. Rulf, Monatshefte Math. Phys. 21, (1910), S. 333.

Wir werden zeigen, daß die Bifekanten einer solchen kubischen Raumkurve die Polargeraden einer Ebene des Liefchen- $R_3$  sind.

Zunächst bilden im  $R_3$  die Polargeraden einer Ebene in bezug auf die  $\infty^1 M_3^2$  eines Büschels ebenfalls nach C. Segre<sup>38)</sup> eine rationale Regelfläche  $F_2^3$ . Die „Sekantenebenen“ dieser  $F_2^3$ , die  $F_2^3$  längs Kegelschnitten schneiden, sind die Polarebenen der Punkte der Ausgangsebene. Die zu einer Ebene des Liefchen- $R_3$  polare  $F_2^3$  enthält, insbesondere den Ort  $C^4$  der Pole des Liefchen- $R_3$  in bezug auf alle  $M_3^2$  des Büschels, also die Geraden  $\mathfrak{G}$  und  $\overline{\mathfrak{G}}$  und den Kreis  $\mathfrak{H}$ . Sie schneidet demnach den Liefchen- $R_3$  in einer  $C^3$ , welche die Punkte  $J$ ,  $\overline{J}$  und  $s_1, s_2$  enthält.

Nun hat jede Sekantenebene der  $F_2^3$  mit einer  $C^3$ , die der  $F_2^3$  angehört, zwei Punkte gemein. Sie schneidet demnach den Liefchen- $R_3$  in einer Bifekante der Schnitt- $C^3$  von  $F_2^3$  mit dem Liefchen- $R_3$ . Damit sind die Bifekanten dieser  $C^3$  als Polargeraden der Punkte der Ausgangsebene erkannt.

Die Untersuchung bezieht sich zunächst auf Ebenen allgemeiner Lage; es bleibt uns die Untersuchung des Horizontalebenen.

b) Horizontalebenen: Diese Ebenen sind charakteristische Ebenen; den Punkten einer charakteristischen Ebene entspricht in dem mit  $\Gamma$  verbundenen Polarsystem das System der charakteristischen Ebenen durch den Polpunkt der Ebene. Diese charakteristischen Ebenen durch den Polpunkt schneiden den Liefchen- $R_3$  im allgemeinen in einer Rotationskongruenz<sup>39)</sup>. Somit liegen — den  $\infty^1$  Horizontalebenen des Liefchen- $R_3$  entsprechend — in unserem zyklisch-tetraedralen Komplex  $\infty^1$  Rotationskongruenzen mit Leitgeraden durch  $J$  und  $\overline{J}$ .

Unter diesen Kongruenzen befinden sich u. U. aber zwei nicht notwendig verschiedene Geradenbündel. Den  $\infty^1$  Horizontalebenen entspricht — wie bekannt<sup>40)</sup> — die Kette der reellen Parallelen zur  $X$ -Achse. Bei der Polarität an  $C$  entsteht aus der die uneigentliche Gerade enthaltenden Geradenkette  $\pi$  eine, durch den Mittelpunkt von  $C$  laufende Punktkette  $\rho$  auf der Polaren des uneigentlichen Punktes der  $X$ -Achse.  $\pi$  schneidet die Polare in einer Punktkette  $\pi^*$ , und es können dann drei Fälle eintreten, je nachdem sich die Punktketten  $\pi^*$  und  $\rho$  in zwei Punkten:  $S_1, S_2$  schnei-

<sup>38)</sup> Siehe S. 22, Anm. 34.

<sup>39)</sup> Siehe S. 13.

<sup>40)</sup> Siehe S. 12. Hier wird der Begriff der Kette vorausgesetzt, den wir systematisch erst in § 3 behandeln.

den, sich berühren, oder sich nicht schneiden. Im Segreschen- $R_4$  entspricht nun dieser Punktkette  $\wp$  ein auf der Polarebene der uneigentlichen Gerade  $\wp$  durch den Scheitel  $m$  des Kegels vom Range 4 laufender Kreis. Es ist der schon als Teil der zerfallenden  $C^4$  genannte Kreis  $\wp$ : Die Polarebenen aller  $\infty^2$  Punkte einer Horizontalebene erfüllen das System der  $\infty^2$  charakteristischen Ebenen durch den der Horizontalebene entsprechenden Pol auf dem Kreis  $\wp$ . Die Schnittpunkte des Kreises  $\wp$  mit dem Liefchen- $R_3$  — die Bildpunkte von  $S_1, S_2$  — sind, wie wir wissen, die eigentlichen Eckpunkte  $s_1, s_2$  des zum zyklisch-tetraedralen Komplex gehörigen Haupttetraeders. Daher gilt:

Je nachdem der Kreis  $\wp$  den Liefchen- $R_3$  in zwei verschiedenen reellen, zwei zusammenfallenden, oder in zwei konjugiert-komplexen Punkten schneidet, enthält der zyklisch-tetraedrale Komplex zwei verschiedene, zusammenfallende, oder keine Geradenbündel.

Polargeraden der Punkte einer Geraden des Liefchen- $R_3$ : Wiederum nach C. Segre<sup>41)</sup> gilt: Die Polarebenen einer Geraden des  $R_4$  in bezug auf die  $\infty^1 M_3^2$  eines Büschels bilden eine  $M_3^2$  vom Range 4, deren erzeugende Ebenen der einen Art die Polarebenen der Punkte der Geraden sind. Die einer Geraden des Liefchen- $R_3$  entsprechende  $M_3^2$  muß wiederum den Ort  $C^4$  der Pole des Liefchen- $R_3$  in bezug auf die  $M_3^2$  des Büschels enthalten. Infolgedessen läuft das Hyperboloid, in dem die  $M_3^2$  den Liefchen- $R_3$  schneidet, durch  $J$  und  $J$ <sup>42)</sup> und die beiden Punkte  $s_1, s_2$ , also durch die vier Tetraederpunkte. Den Punkten einer Geraden entsprechen somit als „Polargeraden“ die dem zyklisch-tetraedralen Komplex angehörenden Erzeugenden eines durch die vier Eckpunkte des Komplextetraeders laufenden Hyperboloids.

### § 3. Die Ketten der komplexen Ebene.

9. Die binäre Punktkette. In § 2 haben wir als Beispiel für Kurven der komplexen Ebene den Kegelschnitt behandelt. In dem nun folgenden Paragraphen sollen die Segreschen und Liefchen Bilder derjenigen

<sup>41)</sup> Siehe S. 22, Anm. 34.

<sup>42)</sup> Es hat also horizontale Kreischnitte.

Gebilde der komplexen Ebene aufgesucht werden, die von von Staudt<sup>43)</sup>, C. Segre<sup>44)</sup>, C. Juel<sup>45)</sup> in die Geometrie eingeführt worden sind und die als Ketten (catene) bezeichnet werden.

In der komplexen Ebene können wir eindimensionale, zweidimensionale, dreidimensionale Punktmannigfaltigkeiten unterscheiden. Sie werden als Fäden (fili), Membrane (tele), Punktkomplexe<sup>46)</sup> bezeichnet. Ihnen werden im Segreschen- $R_4$  die reellen Züge von Kurven, Flächen, Hyperflächen entsprechen. Spezielle Punktmannigfaltigkeiten dieser Art sind die Punktketten. Zu ihnen sind ein-, zwei-, und dreidimensionale<sup>47)</sup> Geradenketten dual. In den Nr. 9, 10 behandeln wir die eindimensionalen Ketten, in den Nr. 11, 12 die zweidimensionalen, in der Nr. 13 die dreidimensionalen<sup>47)</sup> Ketten.

Eine binäre Punktkette der komplexen Ebene ist ein Faden, der komplex projektiv äquivalent zu dem Faden der reellen Punkte einer reellen Geraden ist.

Eine solche Punktkette liegt also stets auf einer Geraden, ihre Abbildung ist daher in der Abbildung dieser Geraden auf die entsprechende charakteristische Ebene enthalten. Die charakteristische Ebene wird hierbei das Gaußsche Bild<sup>48)</sup> der Geraden, und es ist bekannt, daß hierbei die Kreise (und Geraden) den binären Punktketten der komplexen Geraden entsprechen. Die möglichen Sonderfälle stellen wir in einer Tabelle zusammen:

$\infty^7$  binäre Punktketten ohne uneigentlichen Punkt.

$\infty^6$  „Normalketten“, d. s. Ketten mit uneigentlichem Punkt.<sup>49)</sup>

$\infty^3$  uneigentliche Punktketten.

$\infty^7$  Kreise in charakteristischen Ebenen.

$\infty^6$  Geraden (in charakteristischen Ebenen).

$\infty^3$  Kreise der uneigentlichen charakteristischen Ebene<sup>50)</sup> = Reguli der absoluten Kongruenz.

<sup>43)</sup> G. C. Chr. v. Staudt: Beiträge zur Geometrie der Lage, insbesondere 2. Heft, Nürnberg, 1857, § 15.

<sup>44)</sup> Siehe S. 5, Anm. 5.

<sup>45)</sup> Siehe S. 5, Anm. 4.

<sup>46)</sup> Nach H. Beck, Koordinatengeometrie, Berlin, Springer, 1919, S. 199.

<sup>47)</sup> Nach E. Study, Das Imaginäre in der ebenen Geometrie, 2. Teil, herausgeg. E. A. Weiß. Bonn, 1933 und 1934, S. 118.

<sup>48)</sup> Vgl. S. 9.

Soweit die Bilder der auf eigentlichen Geraden gelegenen binären Punktketten nicht ganz dem Lieschen  $R_3$  angehören, schneiden sie diesen  $R_3$  entweder überhaupt nicht, oder in Punkten, oder in Punktepaaren, die jedoch als Bildfiguren nicht in Frage kommen.

Die auf den reellen Parallelen zur X-Achse gelegenen binären Punktketten werden auf die Kreise (und Geraden) der Horizontalebenen abgebildet. Der Bild-Regulus einer Kette uneigentlicher Punkte schneidet schließlich die uneigentliche Ebene des Lieschen- $R_3$  in dem reellen Zuge eines durch  $J, \bar{J}$  laufenden Kegelschnittes<sup>51</sup>).

10. Die binäre Geradenkette. Größeres Interesse als die binären Punktketten bieten die binären Geradenketten, weil die ihnen entsprechenden Systeme charakteristischer Ebenen den Lieschen- $R_3$  in Figuren schneiden, auf welche sich die Geradenketten i. a. eindeutig abbilden lassen.

Binäre Geradenketten werden dual zu den binären Punktketten definiert. Daraus folgt dann, daß eine binäre Geradenkette eine jede Gerade, die nicht durch den Scheitelpunkt der Geradenkette hindurchläuft, in einer binären Punktkette schneidet, und umgekehrt, daß eine binäre Punktkette von einem jedem Punkte, der nicht ihrer Trägergeraden angehört, durch eine binäre Geradenkette projiziert wird. Diese Bemerkung ermöglicht uns die Abbildung der binären Geradenketten im Segreschen Bild- $R_4$ :

Eine Geradenkette schneidet die uneigentliche Gerade der komplexen Ebene in einer binären Punktkette. Wir erhalten demnach eine solche binäre Geradenkette, wenn wir die auf der uneigentlichen Geraden ausgeschnittene Punktkette von einem (eigentlichen) Punkte aus projizieren, und demnach das Bild einer binären Geradenkette im  $R_4$ , wenn wir den Bildregulus der uneigentlichen Punktkette von einem eigentlichen reellen Punkte des  $R_4$  projizieren. Als Bild der Geraden einer binären Geradenkette erhalten wir somit die eine Schar

<sup>49</sup> Nach E. Study, a. a. O., Anm. 34a, S. 120 (§ 13).

<sup>50</sup> Siehe S. 10.

<sup>51</sup> Faßt man die uneigentliche Ebene als Gaußsches Bild der uneigentlichen Geraden auf, so kann auch dieser Kegelschnitt als Kreis bezeichnet werden.

von erzeugenden (charakteristifischen) Ebenen eines Hyperkegels  $M_3^2$  vom Range 4.

Hierbei ist der Scheitel der Geradenkette als eigentlicher Punkt vorausgesetzt. Die Untersuchung aller übrigen Möglichkeiten führt zu folgender Klaffifikation:

### I. Binäre Geradenkette mit eigentlichem Scheitel.

Eine Schar von erzeugenden (charakteristifischen) Ebenen eines Hyperkegels  $M_3^2$  vom Range 4.

### II. Binäre Geradenkette mit uneigentlichem Scheitel.

A.) Die uneigentliche Gerade gehört der Geradenkette nicht an.

Erzeugende (charakteristifische) Ebenen eines Hyperzylinders  $M_3^2$  vom Range 3.

Uneigentlicher Scheitel der Geradenkette.

Absolute Scheitelgerade des Hyperzylinders.

B.) Die uneigentliche Gerade gehört der Geradenkette an.

Die  $M_3^2$  zerfällt in zwei  $R_3$ , von denen einer der uneigentliche  $R_3$  des  $R_4$  ist. ( $M_3^2$  vom Range 2).

Uneigentlicher Scheitel der Geradenkette.

Eigentliche Geraden der Geradenkette.

Uneigentliche Gerade.

Absolute Gerade des eigentlichen  $R_3$ .

(Charakteristifische) Ebenen durch die Gerade, die ganz im eigentlichen  $R_3$  verlaufen.

Uneigentlicher  $R_3$  (uneigentliche charakteristifische Ebene).

Bild einer binären Geradenkette im Liefchen- $R_3$ :  
Bringen wir nun die Bildmannigfaltigkeit einer binären Geradenkette im Segreschen Bild- $R_4$  mit dem Liefchen Bild- $R_3$  zum Schnitt, so haben wir die verschiedenen Möglichkeiten zu berücksichtigen, die durch spezielle Lage des Liefchen- $R_3$  in bezug auf die Bildmannigfaltigkeit entstehen.

#### I. Geradenkette mit eigentlichem Scheitel.

a) Der Scheitel der Geradenkette liegt nicht auf einer reellen Parallelen zur X-Achse.

**1. Die Geradenkette enthält keine (imaginäre) Parallele zur X-Achse.**

Die eine Schar von erzeugenden (charakteristischen) Ebenen des Hyperkegels vom Range 4, der Segresches Bild der Geradenkette ist, trifft den Liefchen- $R_3$  in einer Schar von Erzeugenden eines Hyperboloides. Eine beliebige charakteristische Ebene allgemeiner Lage, insbesondere eine charakteristische Ebene des Liefchen- $R_3$ , schneidet den Hyperkegel in einem Kreise:

Zentrifches Hyperboloid mit horizontalen Kreischnitten.

**2. Die binäre Geradenkette enthält eine imaginäre Parallele zur X-Achse.**

Hyperbolisches Paraboloid mit einer Schar horizontaler Erzeugenden<sup>52)</sup>.

b) Der Scheitel der Geradenkette liegt auf einer reellen Parallelen zur X-Achse.

**1. Die Geradenkette enthält die reelle Parallele zur X-Achse nicht.**

Kegel 2. O. mit horizontalen Kreischnitten.

**2. Die Geradenkette enthält die reelle Parallele zur X-Achse.**

Geradenbüschel und Horizontalebene.<sup>53)</sup>

**II. Der Scheitel der Geradenkette ist uneigentlich.**

**A. Die uneigentliche Gerade gehört der Geradenkette nicht an.**

a) Der Scheitel der Geradenkette ist verschieden von dem uneigentlichen Punkte der X-Achse.

Zylinder 2. O. mit horizontalen Kreischnitten.

b) Der Scheitel der Geradenkette fällt mit dem uneigentlichen Punkte der X-Achse zusammen.

Wir haben nun zwei Geradenketten mit dem gleichen Scheitel: die Kette der reellen Parallelen zur X-Achse und die abzubildende Kette. Diese haben entweder zwei oder eine oder keine Gerade gemeinam. Entsprechend:

---

<sup>52</sup> Bild der imaginären Parallelen zur X-Achse ist die Gerade  $\mathfrak{P}$ , die somit dem Hyperboloid angehört. Die Kreise des allgemeinen Falles zerfallen in  $\mathfrak{P}$  und eine horizontale Erzeugende des Hyperboloids.

<sup>53</sup> Die letztere ist Gaußsches Bild der reellen Parallelen zur X-Achse.

1. Paar von Horizontalebene und die Gerade  $\mathfrak{P}$ .
2. Doppeltzählende Horizontalebene und die Gerade  $\mathfrak{P}$ .
3. Die Gerade  $\mathfrak{P}$ .

B. Die uneigentliche Gerade gehört der Geradenkette an.

a) Der Scheitel der Geradenkette ist verschieden von dem uneigentlichen Punkte der X-Achse.

Parallelenbüschel und die uneigentliche Ebene.

b) Der Scheitel der Geradenkette ist der uneigentliche Punkt der X-Achse.

Eigentliche Ebene, Horizontalebene und die Gerade  $\mathfrak{P}$ .

c) Im Sonderfalle kann es eintreten, daß die abzubildende Geradenkette mit der Kette der reellen Parallelen zur X-Achse zusammenfällt. (Der Liesche- $R_3$  kann somit als Bild einer Geradenkette betrachtet werden, die die uneigentliche Gerade enthält und den uneigentlichen Punkt der X-Achse zum Scheitel hat.)

Der Liesche- $R_3$ .

11. Zweidimensionale Ketten: Bild einer ternären Punkt- und Geradenkette im Segreschen Bild- $R_4$ . Eine in der komplexen Ebene  $\mathfrak{E}$  gelegene ternäre Punktkette wird von der Geraden  $\mathfrak{G}$  aus durch eine ternäre Ebenenkette  $\mathfrak{R}$  projiziert. Wir erhalten das Bild der ternären Punktkette als Erzeugnis der ternären Ebenenkette  $\mathfrak{R}$  durch  $\mathfrak{G}$  und der konjugiert-komplexen Ebenenkette  $\overline{\mathfrak{R}}$  durch  $\overline{\mathfrak{G}}$ .

Durch die Antiprojektivität zwischen den ternären Ebenenketten ist sowohl eine Antiprojektivität als auch eine Projektivität zwischen den zugehörigen Ebenenbündeln  $\mathfrak{G}$ ,  $\overline{\mathfrak{G}}$  festgelegt<sup>34)</sup>. Antiprojektivität und Projektivität transformieren die Ebenen des Bündels  $\mathfrak{G}$ , soweit sie der ternären Kette angehören, in der gleichen Weise. Das Erzeugnis der durch das Konjugium aufeinander bezogenen Ebenenketten  $\mathfrak{G}$ ,  $\overline{\mathfrak{G}}$  ist daher in dem Erzeugnis der projektiv aufeinander bezogenen Ebenenbündel, einer durch die Trägergeraden  $\mathfrak{G}$ ,  $\overline{\mathfrak{G}}$  laufenden rationalen normalen Regelfläche  $F_2^1$ , enthalten. Da sich zwei konjugiert-komplexe Ebenen in einem reellen Punkte schneiden, gilt:

<sup>34)</sup> In der Ebene wird durch das Schicksal von 4 reellen Punkten sowohl eine Kollineation wie eine Antikollineation festgelegt, und diese beiden Transformationen transformieren die Kette der reellen Punkte in gleicher Weise.

Das Segresche Bild einer ternären Punktkette ist der reelle Zug einer durch  $\overline{\mathcal{G}}$  und  $\mathcal{G}$  laufenden rationalen normalen Regelfläche  $F_2^3$ .

Eine Gerade der komplexen Ebene schneidet nun eine ternäre Kette entweder in einem einzigen Punkt oder in einer binären Punktkette. Im letzten Falle heißt die Gerade mit der ternären Kette „vereinigt“. Im allgemeinen Falle schneidet also die abzubildende Kette die uneigentliche Gerade in einem uneigentlichen Punkte  $A$ , der auf eine absolute Gerade  $\mathcal{U}$  abgebildet wird. Diese wird die Leitgerade der  $F_2^3$ . Denn die binäre Kette der durch  $A$  laufenden, mit unserer ternären Kette vereinigt liegenden Geraden schneidet die ternäre Kette in einem System von  $\infty^1$  Normalketten, die sich auf die  $\infty^1$  Erzeugenden unserer  $F_2^3$  abbilden. Wie alle Normalketten durch  $A$  laufen, so schneiden alle Erzeugende von  $F_2^3$  die Gerade  $\mathcal{U}$ .

|                                                                                      |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ternäre Kette<br/>Uneigentlicher Punkt<br/>Normalkette auf der ternären Kette</p> | <p><math>F_2^3</math><br/>Leitgerade der <math>F_2^3</math><br/>Erzeugende der <math>F_2^3</math></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hiermit ist der allgemeine Fall beschrieben; die Untersuchung der Sonderfälle führt zu folgender Klassifikation:

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><math>\infty^8</math> ternäre Punktketten, die mit der uneigentlichen Geraden nicht vereinigt liegen.<br/><math>\infty^8</math> ternäre Punktketten, die mit der uneigentlichen Geraden vereinigt liegen.</p> | <p>Reelle Züge von <math>\infty^8</math> Flächen <math>F_2^3</math> durch <math>\mathcal{G}</math> und <math>\overline{\mathcal{G}}</math>.<br/><br/><math>\infty^8</math> Figuren eines Regulus aus absoluten Geraden und einer eigentlichen Ebene, deren uneigentliche Spur die Geraden dieses Regulus schneidet.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Ternäre Geradenkette:** Mit einer ternären Punktkette ist eine ternäre Geradenkette invariant verbunden: das System der mit der Punktkette vereinigt liegenden Geraden. Das Segresche Bild einer ternären Geradenkette ist daher der Ort aller der charakteristischen

Ebenen, welche die Bildmannigfaltigkeit der entsprechenden Punktkette in Bildern binärer Ketten, Kegelschnitten durch  $\mathfrak{G}$  und  $\overline{\mathfrak{G}}$ , schneiden.

Im Falle einer ternären Kette mit einem einzigen uneigentlichen Punkt haben wir unter den mit der Punktkette vereinigt liegenden Geraden solche zu unterscheiden, die den Punkt A enthalten von solchen, die den Punkt nicht enthalten. Die  $\infty^1$  Geraden der ersten Art, welche die Punktkette in Normalketten schneiden, werden auf die charakteristischen Ebenen abgebildet, welche die Gerade  $\mathfrak{U}$  mit den Erzeugenden der Regel fläche verbinden. Die  $\infty^2$  Geraden der zweiten Art werden auf charakteristische Ebenen abgebildet, welche die  $F_2^3$  längs Kegelschnitten schneiden. Diese Ebenen ergeben sich als Schnittebenen entsprechender  $R_3$  in der durch die Projektivität der Ebenenbündel  $\mathfrak{G}$ ,  $\overline{\mathfrak{G}}$  erzeugten kontragredienten Projektivität.

Im Sonderfalle der mit der uneigentlichen Geraden vereinigt liegenden Punktkette werden die binären Ketten, die die vereinigt liegenden Geraden aus der ternären Punktkette ausschneiden, sämtlich Normalketten, welchen die Geraden der eigentlichen nichtcharakteristischen Bildebene der ternären Punktkette zugeordnet werden. Man erhält die entsprechenden charakteristischen Ebenen, wenn man jede dieser Geraden mit der inzidenten absoluten Geraden verbindet.

**12. Bild einer ternären Punkt- und Geradenkette im Liefchen- $R_3$ .** Als Segresches Bild hatte sich im allgemeinen Falle eine rationale kubische Normal- $F_2^3$  ergeben, welche die Geraden  $\mathfrak{G}$  und  $\overline{\mathfrak{G}}$  enthält. Bringen wir diese mit dem Liefchen- $R_3$  zum Schnitt, so folgt im Liefchen- $R_3$  als Nullstreifen der ternären Punktkette eine kubische Raumkurve, die durch die Punkte J,  $\overline{J}$  hindurchläuft, ein kubischer Kreis.

Die Geraden der mit der Punktkette invariant verbundenen Geradenkette haben zu Bildern im Segreschen- $R_4$  die ( $\infty^2$ ) charakteristischen Sekantenebenen der  $F_2^3$  durch  $\mathfrak{G}$  und  $\overline{\mathfrak{G}}$ . Diese schneiden den Liefchen- $R_3$  in den Geraden einer Kongruenz, der Bisekantenkongruenz des kubischen Kreises, in dem die  $F_2^3$  den Liefchen- $R_3$  schneidet. Dabei treten verschiedene Fälle auf, je nach der Lage, die die  $F_2^3$  zum Liefchen  $R_3$  einnimmt. Wir bringen im folgenden wieder eine vollständige Klassifikation dieser Fälle.

**I. Die uneigentliche Gerade liegt nicht mit der ternären Punktkette vereinigt.**

a) Der (einzige) uneigentliche Punkt der Kette ist verschieden von dem uneigentlichen Punkt der X-Achse.

Durch den uneigentlichen Punkt der X-Achse läuft dann eine einzige mit der Kette vereinigt liegende Gerade.

1. Die mit der Kette vereinigt liegende zur X-Achse parallele Gerade ist imaginär. (Allgemeiner Fall.)

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Kubischer Kreis durch $J, \bar{J}$ | Bifekantenkongruenz (1, 3) der Kurve |
|------------------------------------|--------------------------------------|

2. Die mit der Kette vereinigt liegende, zur X-Achse parallele Gerade ist reell.

|                                                         |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kreis der Horizontalebene und eine ihn treffende Gerade | Horizontalebene (als Bild der reellen Parallelen zur X-Achse) und Kongruenz (1, 2) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

b) Der uneigentliche Punkt der ternären Punktkette ist der uneigentliche Punkt der X-Achse. Dann läuft durch ihn eine binäre Geradenkette von Geraden, die mit der ternären Punktkette vereinigt liegen. Die binäre Geradenkette und die Kette der reellen Parallelen zur X-Achse haben dann entweder zwei (reelle) Geraden, oder eine doppeltzählende (reelle) Gerade, oder keine Gerade gemeinsam. Entsprechend sind folgende Fälle zu unterscheiden:

1. Die ternäre Punktkette liegt mit zwei reellen Parallelen zur X-Achse vereinigt.

|                                                           |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gerade $\mathfrak{P}$ und zwei (horizontale) Treffgeraden | Zwei Horizontalebenen und hyperbolische Kongruenz (1, 1) |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

2. Die ternäre Punktkette enthält den uneigentlichen Punkt der X-Achse und liegt mit einer einzigen reellen Parallelen zur X-Achse vereinigt.

|                                                                    |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Gerade $\mathfrak{P}$ und (horizontale) Treffgerade doppeltgezählt | Horizontalebene und parabolische Kongruenz (1, 1) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

3. Die ternäre Punktkette enthält den uneigentlichen Punkt der X-Achse, liegt aber mit keiner reellen Parallelen zur X-Achse vereinigt.

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Gerade $\mathbb{P}$ | Elliptische Kongruenz $(1, 1)$ |
|---------------------|--------------------------------|

II. Die uneigentliche Gerade liegt mit der ternären Punktkette vereinigt.

a) Die uneigentliche binäre Kette der ternären Punktkette enthält den uneigentlichen Punkt der X-Achse nicht.

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Uneigentlicher „Kreis“ und eine ihn treffende Gerade | Uneigentliche Ebene und Kongruenz $(1, 2)$ |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

b) Die uneigentliche binäre Kette enthält den uneigentlichen Punkt der X-Achse.

Durch diesen Punkt läuft dann eine binäre Geradenkette von Geraden, die mit der ternären Punktkette vereinigt liegen. Diese und die Kette der reellen Parallelen zur X-Achse haben außer der uneigentlichen Geraden entweder eine oder keine Gerade gemeinsam oder sie können schließlich noch identisch sein. Dementsprechend:

1.

|                                                                             |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerade $\mathbb{P}$ , eigentliche Treffgerade und eine uneigentliche Gerade | Horizontalebene, uneigentliche Ebene und hyperbolische Kongruenz $(1, 1)$ mit einer uneigentlichen Leitgeraden |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2.

|                                                             |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gerade $\mathbb{P}$ und uneigentliche Gerade doppeltgezählt | Uneigentliche Ebene und parabolische Kongruenz mit uneigentlicher Leitlinie |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

3.

|                                                |                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gerade $\mathbb{P}$ und eine eigentliche Ebene | Die $\infty^1$ Horizontalebenen und das Geradenfeld der eigentlichen Ebene. |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

Ein Beispiel für den letzten Fall II, b, 3 ist der reelle Zug der komplexen Ebene  $\mathbb{C}$ .

13. Bilder dreidimensionaler<sup>55)</sup> Punkt- und Geradenketten im Segreschen- $R_4$  und im Liefchen Bild- $R_3$ . Dreidimensionale Punktkette heißt die Gesamtheit aller Punkte, die auf den Geraden einer binären Geradenkette liegen.

Den drei Arten binärer Geradenketten (vgl. S. 28) entsprechend haben wir drei Arten dreidimensionaler Punktketten zu unterscheiden. Diese werden im Segreschen- $R_4$  auf dieselben Mannigfaltigkeiten abgebildet, die aber nun als Orte von Punkten anzusehen sind. Die Liefchen Bilder dreidimensionaler Punktketten sind ebenso mit den Liefchen Bildfiguren der entsprechenden binären Geradenketten identisch.

Eine besondere Behandlung erfordern die dual zu definierenden dreidimensionalen Geradenketten. Den drei verschiedenen Arten binärer Punktketten (vgl. S. 26) entsprechend haben wir auch hier drei Fälle zu unterscheiden.

- I. Binäre Punktkette ohne uneigentlichen Punkt als Ort von Geraden:  
Charakteristische Treffebenen eines Kreises in einer charakteristischen Ebene.
- II. Binäre Punktkette mit uneigentlichem Punkt als Ort von Geraden:  
Charakteristische Treffebenen einer eigentlichen Geraden.
- III. Binäre Punktkette der uneigentlichen Geraden als Ort von Geraden:  
Regulus der absoluten Kongruenz als Ort von charakteristischen Ebenen.

Diese Bildmannigfaltigkeiten bringen wir mit dem Liefchen- $R_3$  zum Schnitt:

Bilder dreidimensionaler Geradenketten im Liefchen- $R_3$ :

#### I. Binäre Punktkette ohne uneigentlichen Punkt.

a) Die binäre Punktkette hat allgemeine Lage zur Kette der reellen Parallelen zur X-Achse.

Der Bildkreis der binären Punktkette schneidet den Liefchen- $R_3$  in zwei verschiedenen Punkten (welche mit  $J$ ,  $\bar{J}$  nicht identisch sind). Nach Nr. 9 S. 25 ergibt sich:

<sup>55</sup> Vgl. S. 26, Anm. 47.

Zyklisch-tetraedraler Komplex mit  $J, \bar{J}, s_1, s_2$  als Eckpunkten des Haupttetraeders.

Diesen Sachverhalt wollen wir nun ohne Heranziehung des zitierten allgemeinen Satzes<sup>56)</sup> auch dadurch beweisen, daß wir eine Konstruktion für den tetraedralen Komplex angeben, die im Zusammenhang mit der Geradenkugeltransformation von Wichtigkeit wird:

Die beiden projektiven Ebenenbüschel durch  $\mathcal{G}$  und  $\bar{\mathcal{G}}$ , welche den Bildkreis  $\mathcal{S}$  der binären Punktkette erzeugen, schneiden den Liefchen- $R_3$  in zwei projektiven Geradenbüscheln durch die Punkte  $J$  und  $\bar{J}$ . Die Verbindungsgerade  $\mathcal{P} = J\bar{J}$  gehört dabei — entsprechend unseren Voraussetzungen — keinem der Geradenbüschel an. Die charakteristischen Ebenen der Ebenenmannigfaltigkeit  $I$  schneiden dann den Liefchen- $R_3$  in den reellen Treffgeraden je zweier zugeordneter Geraden. Diese erfüllen bekanntlich einen tetraedralen Komplex.

b) Die binäre Punktkette hat mit der Kette der reellen Parallelen einen Punkt gemein.  
Der Bildkreis berührt nun den Liefchen- $R_3$ :

Kollineationskomplex;  $[(22)(11)]$

c) Die binäre Punktkette liegt auf einer imaginären Parallelen zur  $X$ -Achse.

Der Bildkreis schneidet den Liefchen- $R_3$  in den Punkten  $J, \bar{J}$ :

Kollineationskomplex;  $\{(211)(11)\}$

d) Die binäre Punktkette liegt auf einer reellen Parallelen zur  $X$ -Achse.

Der Bildkreis liegt in einer Horizontalebene des Liefchen- $R_3$ :

Treffgeradenkomplex eines Kreises in einer Horizontalebene;  
 $[(222)]$

Wir kommen jetzt zu dem Fall II, bei dem es sich um die Mannigfaltigkeit der charakteristischen Treffebenen einer eigentlichen Geraden handelt.

## II. Binäre Punktkette mit uneigentlichem Punkt.

a) Die binäre Punktkette hat allgemeine Lage in bezug auf die Kette der reellen Parallelen zur  $X$ -Achse

<sup>56)</sup> Siehe S. 22.

Zyklisch-tetraedraler Komplex<sup>57)</sup> mit der uneigentlichen Ebene als Ebene des Haupttetraeders.

b) Die Trägergerade der binären Punktkette läuft nicht durch den uneigentlichen Punkt der X-Achse, die Punktkette wird auf der Trägergeraden durch die Kette der reellen Parallelen zur X-Achse ausgeschnitten.

Treffgeradenkomplex einer eigentlichen Geraden und Büschel der Ebenen durch  $\mathfrak{P}^{58)}$ .

c) Die Trägergerade der binären Punktkette ist eine imaginäre Parallele zur X-Achse.

Regulärer linearer Komplex, der die Gerade  $\mathfrak{P}$  enthält und Büschel der Ebenen durch  $\mathfrak{P}^{58)}$ .

Die beiden projektiven Geradenbüschel durch  $J, \bar{J}$  (vgl. I, a; S. 36) liegen nun so, daß sie einen Strahl entsprechend gemeinsam haben, ihre Scheitel und Ebenen jedoch verschieden sind. Die Trefflinien entsprechender Geraden erzeugen nach Sylvester einen linearen Komplex.

d) Die Trägergerade der binären Punktkette ist eine reelle Parallele zur X-Achse.

Treffgeradenkomplex einer horizontalen Geraden; dazu das Büschel der Ebenen durch  $\mathfrak{P}^{58)}$ .

### III. Binäre Punktkette der uneigentlichen Geraden.

Im Falle III ist schließlich ein Regulus aus absoluten Geraden Bild der binären Punktkette.

a) Die binäre Punktkette enthält den uneigentlichen Punkt der X-Achse nicht.

Der Bildregulus schneidet den Liefchen- $R_3$  in einem regulären Kegelschnitt durch  $J, \bar{J}$ :

Treffgeradenkomplex eines durch  $J, \bar{J}$  laufenden regulären Kegelschnitts der uneigentlichen Ebene.

b) Die binäre Punktkette enthält den uneigentlichen Punkt der X-Achse.

Der Bildregulus berührt den Liefchen  $R_3$ :

Treffgeradenkomplex einer uneigentlichen Geraden und Büschel der Ebenen durch  $\mathfrak{P}$ .

<sup>57)</sup> Daß der Komplex tetraedral ist, folgt auch nach einem bekannten Satz von C. Segre. Alcune considerazioni elementari sull' incidenza di rette e piani nello spazio a 4 dimensioni, Palermo Rend. 2, (1888), S. 45 bis 52.

<sup>58)</sup> In den Fällen II b, c, d zerfällt der (quadratische) tetraedrale Komplex in zwei lineare Komplexe!

## § 4. Ketten auf Kegelschnitten.

14. Bilder von Punktketten auf Kurven 2. O. im Segreschen- $R_4$  und im Liefchen Bild- $R_3$ . Der reelle Zug eines Kegelschnitts wird bei der Segreschen und auch bei der Liefchen Abbildung auf sich selbst abgebildet. Unterwirft man ihn einer komplexen Kollineation, so erhält man eine Figur, die wir „binäre Kette auf einem Kegelschnitt“ nennen. Der Kegelschnitt ist wie die Gerade ein komplex-binäres Gebiet und enthält wie diese  $\infty^3$  binäre Punktketten. Die Bilder dieser Punktketten sind von Lie als S-Kurven<sup>59)</sup> bezeichnet worden und, ohne ganz in ihrer Bedeutung im Zusammenhang mit der komplexen Geometrie erkannt worden zu sein, untersucht worden. Wir geben hier eine systematische Ableitung dieser Bildfiguren, indem wir wie früher zunächst die Segreschen Bilder der binären Ketten eines komplexen Kegelschnitts auffuchen. Die Überlegenheit dieser Methode der Liefchen Methode gegenüber zeigt sich an diesem Beispiel besonders deutlich; denn da bei Lie der allgemeine Fall, der Natur der Sache nach, nicht vorkommen kann, können auch die von ihm betrachteten Sonderfälle nicht als Spezialfälle ein und derselben Figur erkannt werden.

Wir beginnen damit, eine Kette  $\gamma$  des in  $\mathcal{G}$  gelegenen komplexen Kegelschnitts  $C$  im Segreschen  $R_4$  abzubilden.

Die die Punkte der Kette  $\gamma$  von der Geraden  $\mathcal{G}$  aus projizierenden Ebenen bilden eine (eindimensionale) Ebenenkette auf dem binären Gebiet der erzeugenden Ebenen des den Kegelschnitt  $C$  projizierenden Hyperkegels  $k$ . Die zu den Punkten der Kette  $\gamma$  konjugiert komplexen Punkte erfüllen eine Kette  $\bar{\gamma}$  auf dem konjugiert-komplexen Kegelschnitt  $\bar{C}$ ; infolgedessen erfüllen die zu den Ebenen der Ebenenkette auf dem Hyperkegel  $k$  konjugiert-komplexen Ebenen (sie projizieren  $\bar{\gamma}$  von  $\bar{\mathcal{G}}$  aus) ebenfalls eine eindimensionale Ebenenkette auf dem Hyperkegel  $\bar{k}$ . Deren Ebenen sind somit auf die Ebenen der ersten Ebenenkette durch das Konjugium, also antiprojektiv bezogen. Welches ist nun das Erzeugnis entsprechender Ebenen der Ebenenketten auf den Hyperkegeln  $\bar{k}$ ,  $k$ ?

Wir haben hier dieselbe Überlegung anzustellen, die uns im § 3 des öfteren begegnete und die charakteristisch für die ganze Abbildungsmethode ist. Die beiden antiprojektiv aufeinander bezogenen Ebenenketten auf den Hyperkegeln  $k$ ,  $\bar{k}$  bestimmen eine Antiprojektivität zwi-

<sup>59)</sup> Siehe S. Lie, Gef. Abh. I, Nr. III, S. 23 (§ 11), Nr. IV, S. 35 (§ 22).

schen den erzeugenden Ebenen der beiden Hyperkegel  $k, \bar{k}$ . Entsprechende Ebenen erzeugen den reellen Zug der Bildfläche  $\Gamma$  des Kegelschnitts  $C$ . Durch das Schicksal von drei Ebenen einer der Ebenenketten ist zugleich eine Projektivität zwischen den erzeugenden Ebenen der Hyperkegel  $k, \bar{k}$  bestimmt. Der Ort der Schnittpunkte der einander in einer Projektivität entsprechenden Ebenen ist eine Normalkurve 4. O.<sup>60)</sup> Die Projektivität fällt nun, soweit es sich um Ebenen der Ebenenketten handelt, mit der obigen Antiprojektivität zusammen und als Erzeugnis der beiden antiprojektiv aufeinander bezogenen Ebenenketten ergibt sich der reelle Zug einer der Fläche  $\Gamma$  angehörenden rationalen Normalkurve 4. O.

Wir stellen die als Bildkurven von Ketten auf Kegelschnitten auftretenden Kurven in einer Übersicht zusammen.

Zunächst setzen wir voraus:

# I. Die zur Kette gehörende Kurve $C$ ist zentrisch.

a) Die Kette enthält keinen der beiden uneigentlichen Punkte der Kurve.

1. Bild einer solchen Kette ist im allgemeinen Falle der reelle Zug einer rationalen Normalkurve 4. O., die durch die vier uneigentlichen Doppelpunkte der Bildfläche  $\Gamma$  des Kegelschnitts  $C$  läuft.

2. Die  $C^4$  zerfällt, wenn in der zwischen den beiden Kegelschnitten  $C, \bar{C}$  erklärten Projektivität den uneigentlichen Punkten des Kegelschnitts  $C$  die uneigentlichen Punkte des Kegelschnitts  $\bar{C}$  zugeordnet werden, wobei dann einem solchen uneigentlichen Punkte von  $C$  der nicht zu ihm konjugiert-komplexe uneigentliche Punkt von  $\bar{C}$  entsprechen muß. Das Erzeugnis zerfällt dann in einen Kegelschnitt und die beiden nicht absoluten Geraden der Bildfläche  $\Gamma$ , sodaß als Bildkurve der Kette nur der reelle Zug eines Kegelschnitts erscheint.

b) Die Kette enthält einen uneigentlichen Punkt. Die Bildkurve der Kette besteht nun aus dem reellen Zug einer Normalkurve 3. O., die durch zwei konjugiert-komplexe der vier Doppelpunkte von  $\Gamma$  hindurchläuft, und derjenigen absoluten Geraden, die nicht ihre Bifekante ist.

<sup>60)</sup> Die Grassmannschen Koordinaten einer Ebene des Kegels  $k$  sind in dem binären Parameter  $\lambda$  quadratisch, die Ebenen des projektiv auf ihn bezogenen Kegels sind in demselben Parameter  $\lambda$  quadratisch; die Parameter des Schnittpunktes entsprechender Ebenen also vom 4. Grade in  $\lambda$ .

c) Die Kette enthält die beiden uneigentlichen Punkte der Kurve.

Nun ergibt sich als Bild der Kette der reelle Zug eines Kegelschnitts und die beiden absoluten Geraden der Fläche  $\Gamma$ , deren jede den Kegelschnitt in einem (reellen) Punkte trifft.

Weiterhin nehmen wir nun an:

## II. Die zur Kette gehörende Kurve ist eine Parabel.

a) Die Kette enthält den uneigentlichen Punkt der Parabel nicht.

Bildkurven sind die reellen Züge von Normalkurven 4. O., die den uneigentlichen  $R_3$  in den Schnittpunkten der absoluten Geraden mit den Geraden  $\mathfrak{G}$ ,  $\bar{\mathfrak{G}}$  berühren.

b) Die Kette enthält den uneigentlichen Punkt der Parabel.

Bildkurven sind die reellen Züge von Parabeln, die den uneigentlichen  $R_3$  in einem Punkte der absoluten Geraden von  $\Gamma$  berühren und diese absolute Gerade (doppeltzählend).

Da der Schnitt einer  $C^4$  mit dem Liefchen  $R_3$  nur Punkte liefert, hat es nur Sinn, diejenigen Fälle zu betrachten, in denen ein Teil der zerfallenden  $C^4$  dem Liefchen  $R_3$  angehört. Dies tritt dann ein, wenn sich von der Schnitt- $C^4$  der Fläche  $\Gamma$  eine Kurve 3. O. (Fall I, b, 1 der Nr. 7 des § 2) oder zwei (I, a, 3; II, a, 2) oder ein (I, b, 2; II, b) Kegelschnitt abspalten; die sich abspaltenden Kurven stellen, jede für sich, Kegelschnittketten dar. Diese Fälle sind bei Lie erwähnt<sup>61</sup>).

15. Bilder von Geradenketten auf Kurven 2. Klasse im Segreschen Bild- $R_4$  und im Liefchen Bild- $R_3$ . Geradenketten werden dual zu Punktketten auf Kurven 2. O. definiert. Um das Segresche Bild einer solchen Kette zu erhalten, haben wir sie von  $\mathfrak{G}$  aus durch eine  $R_3$ -Kette zu projizieren und das Erzeugnis dieser  $R_3$ -Kette und der zu ihr konjugiert-komplexen  $R_3$ -Kette aufzufuchen. Die  $R_3$ -Ketten bestehen aus Berührungsflächen von Hyperkegeln vom Range 3. Bezieht man die beiden Mannigfaltigkeiten aller Berührungsfläche dieser Hyperkegel projektiv aufeinander, so wird das Erzeugnis eine von  $\infty^{2.1}$

<sup>61</sup> Gef. Abh. I, Nr. III, IV, vgl. Anm. 59.

Ebenen beschriebene  $M_3^4$ <sup>82)</sup>. Nach einem nun schon öfters ausgeführten Schlusse wird daher das Bild der Geradenkette der reelle Zug einer solchen  $M_3^4$ , deren Ebenen übrigens als Bilder von Tangenten der Kurve 2. O. (charakteristische) Tangentialebenen der Bildfläche  $\Gamma$  dieses Kegelschnitts sind.

Diese  $M_3^4$  besitzt eine Doppelfläche, Ort derjenigen Punkte, durch welche zwei Ebenen der  $M_3^4$  laufen. Es handelt sich um die Bildmannigfaltigkeit der Schnittpunkte zweier Geraden der Geradenkette, also um eine  $F_2^3$  (vgl. Nr. 11, S. 30).

Eine Ausartung der  $M_3^4$  kann nur für solche auf Parabeln gelegene Geradenketten eintreten, welche die uneigentliche Gerade enthalten. Für eine solche Geradenkette zerfällt die  $M_3^4$  in eine  $M_3^3$  und den uneigentlichen  $R_3$ . In diesem Falle zerfällt auch die Doppelfläche  $F_2^3$  in eine eigentliche nicht-charakteristische Ebene und eine der absoluten Kongruenz angehörende  $F^2$ .

Durch Schnitt der Bild- $M_3^4$  (bzw.  $M_3^3$ ) mit dem Liefchen- $R_3$  erhalten wir das

Liefche Bild einer auf einer Kurve 2. Klasse gelegenen Geradenkette.

Die Ebenen der Bild- $M_3^4$  der Geradenkette schneiden den Liefchen- $R_3$  in den Geraden einer Regelfläche 4. O. Diese hat diejenige Kurve 3. O. zur Doppelkurve, in der die Doppelfläche  $F_2^3$  der  $M_3^4$  den Liefchen- $R_3$  schneidet. Da die  $F_2^3$  Bild einer ternären Kette ist, ergeben sich hier zunächst so viele Sonderfälle, als es verschiedene Lagen der Bild- $F_2^3$  einer ternären Kette zum Liefchen  $R_3$  gibt. Wir behandeln nacheinander die möglichen Fälle. Dabei treten sämtliche sechs Arten von Regelflächen 4. Grades (III, IV, V, VI, VII, VIII)<sup>83)</sup> auf, die eine Kurve 3. O. als Doppelkurve haben.

Aus der projektiven Erzeugung der  $M_3^4$  folgt die projektive Erzeugung dieser Regelflächen 4. Grades: Sie sind das Erzeugnis entsprechender Ebenen der projektiv aufeinander bezogenen Berührungsebenen der Minimalzylinder  $\mathcal{R}$ ,  $\overline{\mathcal{R}}$ , in denen die Hyperzylinder  $k$ ,  $\overline{k}$  den Liefchen- $R_3$  schneiden. Hier folgt ebenfalls, daß auf diese Weise Regelflächen 4. Grades, und zwar vom Typus III bis VIII erzeugt werden können.

<sup>82)</sup> Die Ordnung bestimmt sich wie auf S. 39, Anm. 60.

<sup>83)</sup> Bezeichnung nach R. Sturm, Liniengeometrie Bd. I, Leipzig, Teubner 1892, S. 54 ff.

## **I. Die Geradenkette enthält keine reelle Parallele zur X-Achse.**

Solche Geradenketten gibt es auf allen Kurven 2. Kl. Mit der Geradenkette ist — wie bereits erwähnt — eine ternäre Punktkette verbunden, d. i. die Gesamtheit der Schnittpunkte zweier Geraden der Geradenkette. Je nach der Lage der ternären Punktkette zur Kette der reellen Parallelen zur X-Achse sind folgende Fälle zu unterscheiden (wir bedienen uns der Klassifikation auf S. 32 ff.);

- a) Fall I, a, 1: Regelfläche 4. Grades vom Typus III oder IV.
- b) Fälle I, a, 2; II, a: Regelfläche 4. Grades vom Typus V oder VI.
- c) Fälle I, b, 1; I, b, 3; II, b, 1: Regelfläche 4. Gr. vom Typus VII.
- d) Fälle I, b, 2; II, b, 2: Regelfläche 4. Gr. vom Typus VIII.

## **II. Die Geradenkette enthält eine reelle Parallele zur X-Achse.**

Solche Geradenketten gibt es auf allen Kurven 2. Kl., die eine reelle Parallele zur X-Achse enthalten. (Fälle I, a, 2; I, a, 3; I, b, 2; II, a, 1; II, a, 2; II, b der Klassifikation der Kegelschnitte in Nr. 7.)

Es sind folgende Fälle zu unterscheiden:

- a) Fälle I, a, 2; II, a: Regelfläche 3. Grades mit doppelter und einfacher Leitgerade oder Cayleysche Regelfläche.
- b) Fälle I, b, 1; I, b, 3; II, b, 1: Regelfläche 3. Grades mit doppelter und einfacher Leitgerade.
- c) Fälle I, b, 2; II, b, 2: Cayleysche Regelfläche.

## **III. Die Geradenkette enthält zwei reelle Parallelen zur X-Achse.**

Solche Geradenketten gibt es auf allen Kurven 2. Klasse, die zwei reelle Parallelen zur X-Achse enthalten. (Fälle I, a, 3; I, b, 2; II, a, 2; II, b der Nr. 7.)

- a) Fälle I, b, 1; I, b, 3; II, b, 1; I, b, 2; II, b, 2: Regulus allgemeiner Lage<sup>64</sup>).
- b) Fall II, b, 3: Kurve 2. Klasse.

<sup>64</sup> Allgemeine Lage bedeutet hier: der Regulus läuft nicht durch die Punkte J,  $\bar{J}$ . Auszunehmen sind also die Hyperboloide mit horizontalen Kreisschnitten: diese sind — wie bekannt — Bilder von Geradenketten im Geradenbüschel durch einen komplexen Punkt (der als ausgearteter Klassenkegelschnitt angesehen werden kann).

## Zweites Kapitel.

### ABLEITUNG DER GERADENKUGELTRANSFORMATION AUS DER KOMPLEXEN GEOMETRIE.

#### § 5. Begründung der Geradenkugeltransformation aus der Geometrie der komplexen Ebene.

16. Die Euklidische Geradenkugeltransformation. Zwei Räume,  $R_3^I$  und  $R_3^{II}$ , seien so aufeinander bezogen, daß die Punkte des ersten Raumes  $R_3^I$  auf die Geraden des Tangentenkomplexes einer Fläche 2. Klasse in  $R_3^{II}$  abgebildet werden, während umgekehrt den Punkten von  $R_3^{II}$  die Geraden eines regulären linearen Komplexes in  $R_3^I$  entsprechen. Diese Verwandtschaft heißt, je nachdem es sich um eine reguläre oder in eine Kurve 2. Kl. ausgeartete Fläche 2. Kl. handelt, Nichteuklidische oder Euklidische Geradenkugeltransformation.

Die Euklidische Geradenkugeltransformation hat S. Lie mit Hilfe seiner Repräsentation der komplexen Ebene als Bild einer Korrelation dieser Ebene erhalten<sup>65)</sup>.

Wie Lies erste Begründung der Geradenkugeltransformation vermöge der Segreschen Abbildung der komplexen Ebene erhalten werden kann, ist von E. A. Weiß<sup>66)</sup> gezeigt worden. Wir bringen zunächst diese Begründung, jedoch, mit Rücksicht auf die später folgende Ableitung der Nichteuklidischen Geradenkugeltransformation, in etwas veränderter Form.

Im Segreschen Bild- $R_4$  nehmen wir einen Raum ( $R_3^{II}$ ) willkürlich an. Der  $R_3^{II}$  ist das Bild einer dreidimensionalen Punktkette  $\Gamma_2$ , welche die uneigentliche Gerade  $u$  enthält. Unterwerfen wir  $\Gamma_2$  einer Korrelation, von der wir nur verlangen, daß sie einen uneigentlichen Punkt  $o$ <sup>67)</sup> der dreidimensionalen Punktkette, der nicht mit dem Scheitel  $q$  der dreidimensionalen Punktkette  $\Gamma_2$  zusammenfällt, in die uneigentliche Gerade  $u$  transformiert, so geht die dreidimensionale Punktkette  $\Gamma_2$  in eine dreidimensionale Geradenkette  $\Pi_2$  über, welche die uneigentliche Gerade enthält. Bei dieser Korrelation wird insbesondere dem Punkte  $q$  eine

<sup>65)</sup> Siehe S. 5, Anm. 3.

<sup>66)</sup> E. A. Weiß. S. Lies erste Begründung der Geraden-Kugel-Transformation, Math. Ann. 108, 1933.

<sup>67)</sup> Es ist übrigens, zur Ableitung der Euklidischen G.-K.-T. nicht notwendig, daß der Punkt  $o$  uneigentlich ist. Im Falle, daß  $o$  eigentlich ist, erhält man in  $R_3^{II}$  den Treffgeradenkomplex eines eigentlichen in einer Horizontalebene gelegenen Kegelschnittes.

eigentliche Gerade  $g$ , der Verbindungslinie  $oq$  — d. i. der uneigentlichen Geraden — daher der Schnittpunkt  $ug = p$  zugeordnet.

Wir wählen nun eine dreidimensionale Punktkette  $\Gamma_1$  mit dem Scheitel  $p$ , die die uneigentliche Gerade  $u$ , jedoch nicht die Gerade  $g$  enthält. Der dreidimensionalen Punktkette  $\Gamma_1$  entspricht im Segreschen  $R_4$  ein eigentlicher Raum ( $R_3^I$ ); er wird von der dreidimensionalen Geradenkette  $\Gamma_2$  entsprechenden Ebenenmannigfaltigkeit in einem linearen Komplex geschnitten. (Vgl. Nr. 13, S. 37, Fall II, c.)

Die dreidimensionale Punktkette  $\Gamma_1$ , welche ja  $p$  als Scheitel hat, ist durch die Korrelation aus einer dreidimensionalen Geradenkette  $\Pi_1$  entstanden, welche die uneigentliche Gerade als Trägergerade hat und den Punkt  $q$  (als Geradenort) nicht enthält. Die der Geradenkette  $\Pi_1$  entsprechende Ebenenmannigfaltigkeit schneidet den Ausgangsraum  $R_3^{II}$  (nach Nr. 13, S. 37, Fall III, a) in dem Treffgeradenkomplex eines uneigentlichen Kegelschnitts.

So induziert die Korrelation der komplexen Ebene im Segreschen Bild- $R_4$  die euklidische Geradenkugeltransformation.

**17. Bild von Punkt- und Geradenhyperkegelschnitt im Segreschen- $R_4$ .** Aus der Zusammenstellung der Nr. 13 des § 3 ist ersichtlich, daß man als Liefesches Bild einer dreidimensionalen Geradenkette niemals den Tangentenkomplex einer regulären Fläche 2. O. erhalten kann. Eine dreidimensionale Kette läßt sich aber als Ausartung eines Hyperkegelschnitts<sup>68)</sup> auffassen. Wir werden zeigen, wie man unter Zuhilfenahme eines solchen Hyperkegelschnitts die Nichteuklidische Geradenkugeltransformation ableiten kann. Als Vorbereitung haben wir zunächst die Bildmannigfaltigkeiten von Punkt- und Geradenhyperkegelschnitten im Segreschen- $R_4$  zu untersuchen.

**Bild eines Punkthyperkegelschnitts.** Da bei der Segreschen Abbildung die uneigentliche Gerade der komplexen Ebene ausgezeichnet ist, werden die einem Punkthyperkegelschnitt entsprechenden Bildmannigfaltigkeiten verschieden sein, je nachdem der Punkthyperkegelschnitt die uneigentliche Gerade zur Tangente hat oder nicht.

<sup>68)</sup> Eine involutorische Antikorrelation (Antipolarität)  $\Sigma a_{ik} x_i \bar{y}_k = 0$   $a_{ik} = \bar{a}_{ki}$  hat entweder keinen Ruhepunkt, oder sie hat deren  $\infty^3$ ; im letzten Falle heißt die Mannigfaltigkeit der Ruhepunkte Hyperkegelschnitt.

Wir setzen voraus, daß der Punkthyperkegelschnitt mit der uneigentlichen Geraden eine binäre Punktkette II gemeinsam hat. Die durch die Punkte von II hindurchlaufenden ( $\infty^3$ ) Geraden schneiden den Hyperkegelschnitt in ( $\infty^3$ ) binären Punktketten, die je einen uneigentlichen Punkt enthalten, also in  $\infty^3$  „Normalketten“.

Die Normalgleichung eines Hyperkegelschnitts dieser Art lautet:

$$\overline{x_1} \overline{x_1} - \overline{x_2} \overline{x_2} + \overline{x_3} \overline{x_3} = 0$$

Daraus folgt vermöge der Segreschen Abbildung:

$$-x^2 - y^2 + z^2 + p^2 = 1$$

Also: Die Bildmannigfaltigkeit eines Punkthyperkegelschnitts, der die uneigentliche Gerade in einer binären Kette schneidet, ist im Segreschen Bild- $R_4$  der reelle Zug einer reellen regulären, durch die Geraden  $\mathcal{G}$  und  $\overline{\mathcal{G}}$  laufenden  $M_3^2$  mit reellen Geraden. (Punktmannigfaltigkeit  $\mathcal{P}_1$ .)

Den uneigentlichen  $R_3$  des Bild- $R_4$  schneidet die  $M_3^2$  in einer reellen regulären geradlinigen Fläche 2. O. Derjenige Regulus der  $F^2$ , dem die Geraden  $\mathcal{G}$  und  $\overline{\mathcal{G}}$  nicht angehören, besteht ganz aus Geraden der absoluten Kongruenz, und diese sind — soweit sie reell sind — Bilder der Punkte der Punktkette II, in der der Hyperkegelschnitt die uneigentliche Gerade der komplexen Ebene schneidet. Eine jede durch eine solche reelle Gerade hindurchlaufende charakteristische Ebene — Bild einer der  $\infty^3$  durch die Punkte von II laufenden Geraden — schneidet  $M_3^2$  in einer weiteren reellen Geraden. Somit folgt:

Die  $\infty^3$  reellen Geraden der Bild- $M_3^2$  eines Hyperkegelschnittes allgemeiner Lage sind die Bilder der  $\infty^3$  Normalketten dieses Hyperkegelschnitts.

Falls der Punkthyperkegelschnitt die uneigentliche Gerade der komplexen Ebene berührt, ergibt sich als Bildmannigfaltigkeit der reelle Zug einer singulären  $M_3^2$  (Punktmannigfaltigkeit  $\mathcal{P}_2$ ).

Dieser Fall wird uns aber nicht interessieren.

Bild eines Geradenhyperkegelschnittes. Wir wollen nun die Bildmannigfaltigkeit eines Geradenhyperkegelschnitts untersuchen. Es sind zwei Fälle möglich: Der Geradenhyperkegelschnitt kann die uneigentliche Gerade enthalten oder nicht. Wir gehen zunächst auf den letzten Fall ein.

Einen Geradenhyperkegelschnitt erhalten wir dadurch, daß wir auf einen Punkthyperkegelschnitt eine (komplexe) Korrelation ausüben. Das Bild eines Geradenhyperkegelschnitts entsteht daher dadurch, daß wir auf das Bild des Punkthyperkegelschnitts die Bildverwandtschaft der Korrelation ausüben. Nun kann eine durch die Geraden  $\mathfrak{G}$  und  $\overline{\mathfrak{G}}$  laufende  $M_3^2$  erzeugt werden, indem man die Ebenen des Bündels  $\mathfrak{G}$  projektiv auf die  $R_3$  des  $R_3$ -Bündels  $\overline{\mathfrak{G}}$  bezieht und entsprechende Elemente zum Schnitt bringt. Einer Korrelation der komplexen Ebene entspricht aber in der Segreschen Abbildung eine reelle Verwandtschaft des Bild- $R_4$ <sup>69)</sup>, die erhalten wird, wenn man die Ebenen des Ebenenbündels durch  $\mathfrak{G}$  projektiv auf die  $R_3$  des  $R_3$ -Bündels durch  $\mathfrak{G}$ , und die Ebenen des Ebenenbündels durch  $\overline{\mathfrak{G}}$  durch die konjugiert-komplexe Projektivität auf die  $R_3$  des  $R_3$ -Bündels durch  $\overline{\mathfrak{G}}$  bezieht: Ein Punkt bestimmt aus jedem Bündel eine Ebene und die den beiden Ebenen zugeordneten  $R_3$  schneiden sich in der dem vorgegebenen Punkte entsprechenden charakteristischen Ebene. Infolgedessen ergibt sich folgende Konstruktion der Bildmannigfaltigkeit eines Geradenhyperkegelschnitts:

Man beziehe die  $R_3$  des  $R_3$ -Bündels  $\mathfrak{G}$  projektiv auf die  $R_3$ -Büschel (Ebenen) des Bündels  $\overline{\mathfrak{G}}$ , und bringe entsprechende  $R_3$  der beiden Bündel zum Schnitt. Die reellen Schnittebenen sind dann diejenigen (charakteristischen) Ebenen, die Bilder der Geraden des Geradenhyperkegelschnitts sind. (Ebenenmannigfaltigkeit  $\mathfrak{E}_1$ ).

Wir wollen noch feststellen, wie ein  $R_3$  eine solche Ebenenmannigfaltigkeit  $\mathfrak{E}_1$  schneidet. Die  $R_3$  des  $R_3$ -Bündels durch die Gerade  $\mathfrak{G}$  schneiden den  $R_3$  in Ebenen eines Ebenenbündels  $J$  ( $J$  sei der Schnittpunkt der Geraden  $\mathfrak{G}$  mit dem  $R_3$ ), ebenso schneiden die  $R_3$  des  $R_3$ -Bündels durch die Gerade  $\overline{\mathfrak{G}}$  in Ebenen eines Ebenenbündels  $\overline{J}$ . Durch die korrelative Beziehung zwischen den  $R_3$ -Bündeln  $\overline{\mathfrak{G}}$  und  $\mathfrak{G}$  werden auch die Ebenenbündel  $J$  und  $\overline{J}$  korrelativ aufeinander bezogen, und die Schnittgeraden entsprechender Ebenen bilden somit einen Hirstschen Komplex<sup>70)</sup>. Die Singularitätenfläche des

<sup>69)</sup> Die Bildverwandtschaft einer Korrelation ordnet dadurch jedem eigentlichen Punkte des  $R_4$  (evt. mit Ausnahme des Bildpunktes desjenigen Punktes, dem die uneigentliche Gerade zugeordnet wird) eine charakteristische Ebene zu.

<sup>70)</sup> Charakteristik  $[(11)(11)2]$ .

Komplexes zerfällt außer in eine  $F^2$  in diejenigen beiden Ebenen der Ebenenmannigfaltigkeit  $\mathbb{E}_1$ , die (durch die Kongruenzgerade  $\mathfrak{P} = JJ$  hindurchgehen und) ganz innerhalb unseres  $R_3$  verlaufen. Ausartungen dieses Komplexes können nicht auftreten.

Wir haben nun noch den für uns wichtigen Fall zu betrachten, daß die uneigentliche Gerade dem Hyperkegelschnitt angehört.

Dem entspricht im Bild- $R_4$ , daß das  $R_3$ -Büschel im Bündel  $\overline{\mathfrak{G}}$ , welches dem uneigentlichen  $R_3$  als  $R_3$  des Bündels  $\mathfrak{G}$  zugeordnet ist, diesen  $R_3$  enthält (Ebenenmannigfaltigkeit  $\mathbb{E}_2$ ).

Ein  $R_3$  allgemeiner Lage schneidet diese Ebenenmannigfaltigkeit  $\mathbb{E}_2$  wie im allgemeinen Falle in einem Hirstschen Komplex; jedoch gibt es  $\infty^2$   $R_3$ , die  $\mathbb{E}_2$  in einem linearen Komplex (der Hirstsche Komplex zerfällt in einen regulären linearen Komplex und den Treffgeradenkomplex der absoluten Geraden des  $R_3$ ) schneidet, und zwar läuft durch jede Gerade der absoluten Kongruenz ein einziger dieser  $R_3$ . Ausgenommen ist nur die Gerade, die dem uneigentlichen Berührungspunkte des Hyperkegelschnitts entspricht <sup>71</sup>).

18. Die Nichteuklidische Geradenkugeltransformation. Die Grundlage der Nichteuklidischen Geraden-Kugeltransformation ist die Abbildung der Punkte eines Raumes  $R_3^I$  auf die Geraden einer regulären  $M_3^2$  des  $R_4$ . Bei dieser Abbildung wird im Raume  $R_3^I$  ein regulärer linearer Komplex ausgezeichnet, dessen Geraden ihrerseits die Bilder der auf  $M_3^2$  gelegenen Punkte sind. Durch Projektion der  $M_3^2$  von einem nicht auf ihr gelegenen Punkte aus auf einen Raum  $R_3^{II}$  entsteht aus der Geradenmannigfaltigkeit der  $M_3^2$  der Tangentenkomplex einer Fläche 2. O.

Wir zeigen im folgenden, wie sich diese aus der Liniengeometrie wohlbekannte Abbildung als Bild einer Korrelation der komplexen Ebene ergibt.

Die Punkte eines Punkthyperkegelschnitts allgemeiner Lage der komplexen Ebene bilden sich auf die Punkte einer Punktmannigfaltigkeit  $\mathfrak{P}_1$

<sup>71</sup> Abgesehen vom uneigentlichen Berührungspunkte des Hyperkegelschnittes können von jedem Punkte der uneigentlichen Geraden  $\infty^1$  Tangenten an den Hyperkegelschnitt gezogen werden. Diese bilden eine binäre Kette, der auch die uneigentliche Gerade angehört. Eine solche Kette wird also im  $R_4$  auf einer  $R_3$  abgebildet und für einen solchen  $R_3$  zerfällt der Hirstsche Komplex.

ab, also auf die reellen Punkte einer  $M_3^2$  mit reellen Geraden (vgl. S. 45). Unterwerfen wir den Punkthyperkegelschnitt einer Korrelation, so gehen die Punkte des Punkthyperkegelschnitts in die Geraden eines Geradenhyperkegelschnitts über, und die Bildverwandtschaft der komplexen Korrelation führt dementsprechend im  $R_4$  die Punktmannigfaltigkeit  $\mathfrak{P}_1$  in eine Ebenenmannigfaltigkeit  $\mathfrak{E}_1$  oder  $\mathfrak{E}_2$  über. Wir hatten nun bereits (siehe S. 47) gesehen, daß nur im Falle einer Ebenenmannigfaltigkeit  $\mathfrak{E}_2$  durch Schnitt mit einem Raume  $R_3$  ein linearer Komplex gewonnen werden kann. Wir müssen daher fordern, daß die Bildtransformation die Punktmannigfaltigkeit  $\mathfrak{P}_1$  in eine Ebenenmannigfaltigkeit  $\mathfrak{E}_2$  transformiere. Für die ebene Korrelation ergibt sich daher die Forderung, daß sie den Punkthyperkegelschnitt in einen Geradenhyperkegelschnitt transformiere, der die uneigentliche Gerade enthält.

Aber diese Bedingung genügt noch nicht zur Charakterisierung der ebenen Korrelation. Würden wir nämlich im  $R_4$  als Schnitttraum  $R_3^I$  einen beliebigen unter den  $\infty^2$  Räumen wählen, die die Ebenenmannigfaltigkeit  $\mathfrak{E}_2$  in einem linearen Komplex schneiden, so wäre wohl erreicht, daß den Punkten der Bild- $M_3^2$  durch die Bildverwandtschaft die Geraden des linearen Komplexes in  $R_3^I$  zugeordnet würden, aber umgekehrt würden den Punkten von  $R_3^I$  im allgemeinen nicht die Geraden der  $M_3^2$  entsprechen (sondern Kreise).

In der Tat: Ein solcher Raum  $R_3^I$ , der die Bildmannigkeit  $\mathfrak{E}_2$  in einem linearen Komplex schneidet, ist das Bild einer als Punktort aufgefaßten Geradenkette  $\Gamma$ , welche die uneigentliche Gerade enthält <sup>72</sup>). Die zur vorgegebenen Korrelation inverse Korrelation transformiert die Geradenkette  $\Gamma$  in eine Punktkette allgemeiner Lage, deren Geraden den Punkthyperkegelschnitt in binären Ketten schneiden, die im allgemeinen Falle keine Normalketten sein werden und daher auf nicht geradlinige Kreife von  $M_3^2$  abgebildet werden. Sollen anstelle dieser Kreife Geraden entstehen, so müssen die Geraden der Punktkette in Normalketten schneiden, die Punktkette muß mit der auf der uneigentlichen Geraden gelegenen Punktkette II des Punkthyperkegelschnitts identisch sein. Unsere Geradenkette  $\Gamma$  muß daher bei unserer Korrelation aus der uneigentlichen binären Kette II des Punkthyperkegelschnitts entstanden sein. Dies

<sup>72</sup> Vgl. die Anm. auf S. 47.

ist dann und nur dann der Fall, wenn die Korrelation die uneigentliche Gerade  $u$  in einen uneigentlichen Punkt,  $p$ , transformiert.

Die beiden der Korrelation aufzuerlegenden Bedingungen lassen sich in eine einzige zusammenfassen: Die Korrelation muß einen uneigentlichen Punkt  $o$  des Punkthyperkegelschnitts in die uneigentliche Gerade  $u$  transformieren. (Vgl. S. 43.)

So sind wir zu folgendem Endresultat geführt worden:

Um im Segreschen- $R_4$  die Abbildung der Punkte eines Raumes  $R_3^1$  auf die Geraden einer  $M_3^2$  und gleichzeitig die Abbildung der Punkte der  $M_3^2$  auf die Geraden eines linearen Komplexes in  $R_3^1$  als Bild einer Korrelation der komplexen Ebene zu erhalten, hat man in der komplexen Ebene 1. einen regulären Punkthyperkegelschnitt ( $M_3^2$ ) beliebig, jedoch so, daß er die uneigentliche Gerade in einer Punktkette schneidet, 2. eine Korrelation so anzunehmen, daß sie einen uneigentlichen Punkt des Punkthyperkegelschnitts in die uneigentliche Gerade transformiert. Die auf der uneigentlichen Geraden gelegene Punktkette des Punkthyperkegelschnitts geht dann durch die Korrelation in eine Geradenkette über, die die uneigentliche Gerade enthält ( $R_3^1$ ).

Damit haben wir im wesentlichen unsere Absicht erreicht; jedoch bleibt noch eine Lücke zu beseitigen. Den eigentlichen Punkten einer Geraden der  $M_3^2$  werden durch die Bildverwandtschaft der Korrelation die Geraden eines Geradenbüschels im Raume  $R_3^1$  zugeordnet; wir erhalten jedoch dieses Büschel nicht vollständig; zu einem binären Gebiet wird es erst, wenn man die Schnittgerade der Ebene des Büschels mit der durch den Scheitel des Büschels laufenden charakteristischen Ebene des Raumes  $R_3^1$  hinzufügt. Treffen wir die Festsetzung:

Dem uneigentlichen Punkte einer eigentlichen Geraden der  $M_3^2$  soll die Gerade zugeordnet sein, in der die Ebene des der Geraden entsprechenden Geradenbüschels die durch den Scheitel des Geradenbüschels laufende charakteristische Ebene schneidet,

so haben wir damit (auch von unserem Standpunkte aus) erreicht, daß die Punkte der  $M_3^2$  lückenlos, umkehrbar ein-

deutig auf die Geraden des linearen Komplexes im Raum  $R_3^{\text{II}}$  bezogen sind.

Projizieren wir  $M_3^2$  von einem ihr nicht angehörigen Punkte auf  $R_3^{\text{II}}$ , so sind die Räume  $R_3^{\text{I}}$  und  $R_3^{\text{II}}$  in der gewünschten Weise aufeinander bezogen.

Hiermit sind wir dann bei der bekannten Ableitung der Nichteuklidischen Geradenkugeltransformation angelangt, die wir daher in ihren Einzelheiten nicht weiter zu verfolgen brauchen.

19. **Zusammenhang zwischen den beiden verschiedenen Arten der Begründung der Geraden-Kugel-Transformation.** Unsere Ableitung der N. E. G. K. T. als Bild einer Korrelation der komplexen Ebene deckt nun auch den Zusammenhang auf, der zwischen LIEs erster Begründung der G. K. T. und der späteren Art der Begründung besteht, die von der liniengeometrischen Abbildung der Geraden eines linearen Komplexes im  $R_3$  auf die Punkte einer  $M_3^2$  im  $R_4$  ausgeht. Denn es hat sich gezeigt, daß eben diese Abbildung gewonnen wird, wenn man einen Punkthyperkegelschnitt der komplexen Ebene einer geeignet gewählten Korrelation unterwirft und das Bild dieser Korrelation im  $R_4$  untersucht. Daß S. LIE diesen Zusammenhang nicht erkannt und somit die Möglichkeit einer N. E. G. K. T. zunächst vereint hat, kann — wie wir schon in der Einleitung bemerkt haben — nur dadurch erklärt werden, daß ihm die notwendigen Voraussetzungen aus der komplexen Geometrie, vor allem die Begriffe Hyperkegelschnitt und Kette, fremd waren. Unsere Untersuchungen haben gezeigt, daß die LIEsche Begründung keineswegs, wie ihr Entdecker späterhin meinte, eine rein „zufällige“ war, sondern daß sie innerhalb der komplexen Geometrie eine systematische Stellung einnimmt.

## § 6. Konstruktion der Nichteuklidischen Geradenkugeltransformation.

20. **Konstruktion der Abbildung: Punkte eines  $R_3$  — Geraden der  $M_3^2$ .** Wie die LIEsche Begründung der Euklidischen Geradenkugeltransformation zu einer Konstruktion der Euklidischen G.-K.-T. führt, wie sie z. B. von LIEBMANN angegeben worden ist, so ergibt sich als Folgerung aus unserer Begründung der Nichteuklidischen G.-K.-T. eine neue Konstruktion der N. E. G. K. T.<sup>73)</sup>, die die LIEBMANNSche Konstruktion als Ausartung liefert.

<sup>73)</sup> Die von LIEBMANN angegebene Konstruktion der N. E. G. K. T. beschränkt sich darauf, nach Ausführung der Konstruktion der E. G. K. T.

Ein Punkthyperkegelschnitt und eine Korrelation der komplexen Ebene seien den Forderungen des letzten Paragraphen entsprechend vorgegeben. Der Korrelation entspricht eine reelle Verwandtschaft des Bild- $R_4$ , die sich ergibt, wenn man zugeordnete Punkte und Geraden der Ebene  $\mathcal{G}$  von  $\mathcal{G}$  aus durch Ebenen und  $R_3$  projiziert und mit den konjugiert-komplexen Ebenen und  $R_3$  (durch  $\overline{\mathcal{G}}$ ) zum Schnitt bringt. Die Bildverwandtschaft wird also durch eine Korrelation (Ebene —  $R_3$ ) im Bündel  $\mathcal{G}$  bestimmt. Wir bringen nun die Ebenen- und  $R_3$ -Bündel durch  $\mathcal{G}$  und  $\overline{\mathcal{G}}$  einerseits mit dem Raume  $R_3^I$ , anderseits mit der  $M_3^2$  zum Schnitt.

Die beiden  $R_3$ -Bündel  $\mathcal{G}$ ,  $\overline{\mathcal{G}}$  schneiden  $R_3^I$  in zwei Ebenenbündeln  $J, \overline{J}$ . Die Ebenen des Ebenenbündels  $\mathcal{G}$  ( $\overline{\mathcal{G}}$ ) schneiden  $M_3^2$  außer in der Geraden  $\mathcal{G}$  ( $\overline{\mathcal{G}}$ ), die ja der  $M_3^2$  angehört, in einer weiteren (Treff)geraden von  $\mathcal{G}$  ( $\overline{\mathcal{G}}$ ). Dabei ist die Gesamtheit der auf  $M_3^2$  gelegenen Treffgeraden<sup>74</sup>) von  $\mathcal{G}$  zunächst perspektiv auf das Ebenenbündel durch  $\mathcal{G}$  und damit projektiv auf das Ebenenbündel durch  $J$  bezogen. Das Ebenenbündel  $\overline{J}$  wird ebenso, durch die konjugiert-komplexe Projektivität, auf die Gesamtheit der  $M_3^2$  angehörigen Treffgeraden der Geraden  $\overline{\mathcal{G}}$  bezogen. Den Geraden im Bündel  $J$  ( $\overline{J}$ ) entsprechen dabei die Gerade  $\mathcal{G}$  ( $\overline{\mathcal{G}}$ ) enthaltende reguläre „orientierte“ Flächen 2. O. auf  $M_3^2$ , die von den  $R_3$  des  $R_3$ -Bündels  $\mathcal{G}$  ( $\overline{\mathcal{G}}$ ) aus der  $M_3^2$  ausge schnitten werden:

Gerade des Bündels  $J$  — Verbindungsebene mit  $\mathcal{G}$  — Korrelativ zugeordneter  $R_3$  — Orientierte Fläche auf  $M_3^2$ .

---

den Treffgeradenkomplex eines (absoluten) Kegelschnitts durch eine Punkttransformation in den Tangentenkomplex einer  $F^2$  überzuführen, was bekanntlich nur im allgemeinen möglich ist. — Von „Konstruktion“ kann im Folgenden nur in demselben Sinne die Rede sein wie bei Liebmann in seinen Ausführungen über den Euklidischen Fall. Hier wird vielmehr, ebenso wie bei Liebmann, geometrisch (durch rein projektive Zuordnungen) die Möglichkeit der Abbildung nachgewiesen.

Eine wirkliche Durchführung der Konstruktion in dem Sinne, wie sie im Euklidischen Falle H. Beck: Konstruktion der Geraden-Kugel-Transformation, Monatshefte Math. Phys. 39, 1932, gegeben hat, bietet keine wesentlichen Schwierigkeiten, soll aber, da sie mit dem hier gewählten Ausgangspunkt nichts mehr zu tun hat, einer besonderen Darstellung vorbehalten bleiben.

<sup>74</sup> Diese Gesamtheit bildet ein ternäres Gebiet.

Da die Korrelation der komplexen Ebene den komplexen Punkt  $p$ , Bild der absoluten Geraden  $\mathbb{P} = \overline{JJ}$  von  $R_3^I$ , in die uneigentliche Gerade  $u$  der komplexen Ebene transformiert, wird denjenigen beiden Ebenen der Bündel  $\mathfrak{G}$  und  $\overline{\mathfrak{G}}$ , die die absolute Gerade  $\mathbb{P}$  projizieren, in den  $R_3$ -Bündeln beide Male derselbe  $R_3$ : der von  $\mathfrak{G}$  und  $\overline{\mathfrak{G}}$  aufgespannte uneigentliche  $R_3$  zugeordnet. Dieser schneidet  $M_3^2$  in ihrer absoluten  $F^2$ . Der gemeinsamen Geraden der Bündel  $J, \overline{J}$  im Raume  $R_3^I$  entspricht somit auf  $M_3^2$  sowohl in der Treffgeradenmannigfaltigkeit  $\mathfrak{G}$  als auch  $\overline{\mathfrak{G}}$  dieselbe orientierte  $F^2$ , die im uneigentlichen  $R_3$  des Bild- $R_4$  liegende  $F^2$  der  $M_3^2$ , aufgefaßt als Ort absoluter Geraden.

Durch einen reellen Punkt  $X$  von  $R_3^I$  läuft nun eine Gerade des Bündels  $J$  und die zu dieser konjugiert-komplexe Gerade des Bündels  $\overline{J}$ . Diesen beiden Geraden entsprechen zwei konjugiert komplexe Ebenen durch  $\mathfrak{G}$  und  $\overline{\mathfrak{G}}$ . Ihnen werden durch die Bildverwandtschaft der komplexen Korrelation zwei  $R_3$  durch  $\mathfrak{G}$  und  $\overline{\mathfrak{G}}$  zugeordnet, die sich in einer reellen (charakteristischen) Ebene schneiden. Diese charakteristische Ebene schneidet schließlich  $M_3^2$  außer in einer absoluten Geraden der uneigentlichen  $F^2$  noch in einer weiteren eigentlichen reellen Geraden der  $M_3^2$ ; es ist die Gerade, die dem Punkte  $X$  in unserer Punkt-Geradenverwandtschaft zuzuordnen ist.

Umgekehrt läuft durch einen (reellen) Punkt  $Y$  der  $M_3^2$  je eine der  $M_3^2$  angehörigen Treffgeraden von  $\mathfrak{G}$  und  $\overline{\mathfrak{G}}$ ; diese werden von zwei (konjugiert-komplexen) Ebenen durch  $\mathfrak{G}$  und  $\overline{\mathfrak{G}}$  ausgeschnitten. In der Bildverwandtschaft der komplexen Korrelation werden diesen Ebenen zwei (ebenfalls konjugiert-komplexe)  $R_3$  durch  $\mathfrak{G}$  und  $\overline{\mathfrak{G}}$  zugeordnet, die  $R_3^I$  in zwei (konjugiert-komplexen) Ebenen der Ebenenbündel  $J, \overline{J}$  schneiden. Diese Ebenen bestimmen eine (reelle) Schnittgerade, die — wie wir früher gezeigt haben — einem linearen Komplex angehört.

Zerstören wir nun noch den konjugiert-komplexen Zusammenhang zwischen den Ebenenbündeln  $J, \overline{J}$  einerseits und den Treffgeraden von  $\mathfrak{G}$  und denen von  $\overline{\mathfrak{G}}$  anderseits, dadurch, daß wir im Raume  $R_3^I$  eine komplexe Projektivität ausführen, und erweitern wir die Konstruktion ins komplexe Gebiet, so ergibt sich die folgende

### Konstruktion der Abbildung: Punkte eines $R_3$ — Geraden der $M_3^2$ :

Im Raume  $R_3^I$  seien zwei Ebenenbündel  $J, J'$ , auf der  $M_3^2$  zwei windschiefe Geraden  $\mathfrak{G}, \mathfrak{G}'$  gegeben. Zwischen den Ebenen des Ebenenbündels  $J$  und den der  $M_3^2$  angehörigen Treffgeraden der Geraden  $\mathfrak{G}$  sei eine projektive Beziehung hergestellt, ebenso zwischen den Ebenen des Ebenenbündels  $J'$  und den Treffgeraden der Geraden  $\mathfrak{G}'$ . Diesen beiden Zuordnungen sei nur die Beschränkung auferlegt, daß der gemeinsamen Geraden  $\mathfrak{P} = J \cap J'$  dieselbe orientierte  $F^2$  — nämlich die durch  $\mathfrak{G}$  und  $\mathfrak{G}'$  bestimmte — entspricht. Dann erfolgt die verlangte Abbildung durch folgende Konstruktion:

Punkt  $X$  von  $R_3^I$  — Verbindungsgeraden von  $X$  mit  $J, J'$  — orientierte  $F^2$  durch  $\mathfrak{G}$  bzw.  $\mathfrak{G}'$  — gemeinsame Gerade dieser  $F^2$  <sup>75)</sup>).

21. Die durch die Projektion der  $M_3^2$  hervorgerufene Einzweideutigkeit der Verwandtschaft. Um von der besprochenen Ableitung zu einer möglichst einfachen Konstruktion der N. E. G. K. T. zwischen  $R_3^I$  und einem zweiten Raume  $R_3^{II}$  zu gelangen, erweist es sich als zweckmäßig, als „Kugelraum“  $R_3^{II}$ , d. i. als Raum, in den  $M_3^2$  projiziert wird, den von den Geraden  $\mathfrak{G}$  und  $\mathfrak{G}'$  aufgespannten  $R_3$  des  $R_4$  zu wählen, und von dem Polpunkte  $O$  dieses  $R_3$  in bezug auf  $M_3^2$  zu projizieren. Die Geraden der  $M_3^2$  gehen dann in die Geraden des Tangentenkomplexes der im Raume  $R_3^{II}$  liegenden Fläche 2. O. der  $M_3^2$ :  $O$ , über.

Da eine jede Ebene, die eine Gerade der  $M_3^2$  enthält, die  $M_3^2$  auch noch in einer weiteren Geraden schneidet, wird der im Raume  $R_3^{II}$  liegende Tangentenkomplex doppelt überdeckt. Infolgedessen entsprechen einer Geraden des Tangentenkomplexes im allgemeinen zwei Geraden der  $M_3^2$ , denen in unserer Verwandtschaft zwei Punkte des Raumes  $R_3^{II}$  zugeordnet werden.

Bei der Projektion der Geraden der  $M_3^2$  auf den  $R_3^{II}$  gehen insbesondere auch die Treffgeradenmannigfaltigkeiten der Geraden  $\mathfrak{G}(\mathfrak{G}')$  über in die Mannigfaltigkeit der die Erzeugende  $\mathfrak{G}(\mathfrak{G}')$  der Fläche  $O$  treffenden Tangenten. Diese erfüllen eine singuläre lineare Kongruenz mit der Leitgeraden  $\mathfrak{G}(\mathfrak{G}')$ .

Einer Geraden dieser Kongruenz, also einer Trefftangente  $\mathfrak{T}$  der Erzeugenden  $\mathfrak{G}$  entspricht <sup>76)</sup> zunächst ein Paar von Geraden der  $M_3^2$ , ein

<sup>75)</sup> Wegen der Abbildung der Punkte von  $\mathfrak{P}$  auf Geraden der gemeinsamen  $F^2$  vgl. H. Beck, Die beiden Geradenkugeltransformationen von Sophus Lie, Münchener Akademieber. 1917, S. 53.

<sup>76)</sup> Einer (Treff-)erzeugenden der Fläche  $O$  wird nur eine einzige Ebene, eine Ebene durch die Gerade  $\mathfrak{P} = JJ'$  zugeordnet.

Paar von Ebenen, die diese Geraden mit  $\mathfrak{G}$  verbinden, und somit ein zugeordnetes Ebenenpaar im Bündel  $J$  des Raumes  $R_3^1$ . Wir wollen die gegenseitige Lage der Ebenen des Ebenenpaares untersuchen.

Die  $\mathfrak{T}$  von  $O$  aus projizierende Ebene  $E$  schneidet  $M_3^2$  in zwei Geraden  $\mathfrak{T}_1, \mathfrak{T}_2$ , die die Gerade  $\mathfrak{G}$  im Schnittpunkte  $R$  von  $\mathfrak{T}$  und  $\mathfrak{G}$  treffen. Diese Geraden  $\mathfrak{T}_1, \mathfrak{T}_2$  bilden zusammen mit  $\mathfrak{T}$  und der Verbindungslinie  $\mathfrak{S} = RO$  zwei harmonische Geradenpaare. Infolgedessen bilden auch die vier Verbindungsebenen der Geraden  $\mathfrak{T}_1, \mathfrak{T}_2; \mathfrak{T}, \mathfrak{S}$  mit der Geraden  $\mathfrak{G}$  ein harmonisches Ebenenquadrupel. Diesem entspricht in der durch die Bildverwandtschaft der komplexen Ebene vermittelten projektiven Zuordnung ein harmonisches  $R_3$ -Quadrupel durch die Gerade  $\mathfrak{G}$ , das wiederum den Raum  $R_3^1$  in einem harmonischen Ebenenquadrupel schneidet.

Somit sind wir imstande, die Lage des der Tangente  $\mathfrak{T}$  im  $R_3^1$  entsprechenden Ebenenpaares  $T_1, T_2$  anzugeben: Der im  $R_4$  den Punkt  $O$  von  $\mathfrak{G}$  aus projizierenden Verbindungsebene  $\mathfrak{G}\mathfrak{S}$  wird im Ebenenbündel  $J$  eine ausgezeichnete Ebene  $G$  zugeordnet; der Verbindungsebene  $\mathfrak{G}\mathfrak{T}$  eine durch die Gerade  $\mathfrak{P} = JJ'$  laufende Ebene des Raumes  $R_3^1$ .

Ebenso ergibt sich, daß im Bündel  $J'$  eine Ebene  $G'$  ausgezeichnet ist, die der den Punkt  $O$  von  $\mathfrak{G}'$  aus projizierenden Ebene zugeordnet ist, und es folgt:

Die einer Trefftangente  $\mathfrak{T} (\mathfrak{T}')$  von  $\mathfrak{G} (\mathfrak{G}')$  im Bündel  $J (J')$  zugeordneten Ebenen  $T_1, T_2 (T_1', T_2')$  liegen harmonisch zu der ausgezeichneten Ebene  $G (G')$  des Bündels und zu der Verbindungsebene ihrer Schnittgeraden mit der Geraden  $\mathfrak{P}$ .

Die Ebenen  $G, G'$  des Raumes  $R_3^1$  schneiden sich in einer Geraden  $\mathfrak{Q}$ ; die Geraden  $\mathfrak{P}, \mathfrak{Q}$  sind die Leitgeraden der im linearen Komplex ausgezeichneten regulären linearen Kongruenz, deren Geraden den Tangentialebenen der Fläche  $O$  (als Ort von Tangenten der Fläche) zugeordnet werden <sup>77</sup>).

22. Konstruktion der N. E. G. K. T. Nach diesen Vorbereitungen ergibt sich die folgende Konstruktion der N. E. G. K. T. <sup>78</sup>).

<sup>77</sup> Vgl. H. Beck, a. a. O. S. 56.

<sup>78</sup> Siehe S. 50, Anm. 73.

Im Raume  $R_3^I$  seien zwei Ebenenbündel  $J, J'$ ; im Raume  $R_3^{II}$  zwei singuläre lineare Kongruenzen mit den Leitgeraden  $\mathfrak{G}$  und  $\mathfrak{G}'$  vorgegeben, von denen wir voraussetzen wollen, daß sie einen Regulus von Kongruenzgeraden gemeinsam haben. Die mit dem Regulus verbundene Fläche 2. O. heiße „absolute Fläche“, die Geraden des Regulus mögen als Erzeugende der zweiten Schar, die Geraden des polaren Regulus, dem auch die Geraden  $\mathfrak{G}$  und  $\mathfrak{G}'$  angehören, als Erzeugende der ersten Schar der absoluten Fläche bezeichnet werden.

Zwischen den Ebenen des Ebenenbündels  $J$  im Raume  $R_3^I$  und den Geraden der Kongruenz  $\mathfrak{G}$ , und ebenso zwischen den Ebenen des Ebenenbündels  $J'$  und den Geraden der Kongruenz  $\mathfrak{G}'$  sei nun eine Zuordnung hergestellt, und zwar in der folgenden Weise:

Wir zeichnen im Bündel  $J$  ( $J'$ ) eine Ebene  $G$  ( $G'$ ) aus, die die Gerade  $\mathfrak{P} = JJ'$  nicht enthält. Durch die Ebene  $G$  ( $G'$ ) und die Gerade  $\mathfrak{P}$  wird im Bündel eine involutorische Kollineation definiert, welche die Ebenen des Bündels zu Paaren zusammenfaßt. Dann beziehen wir die Ebenenpaare des Bündels  $J$  ( $J'$ ) auf die Geraden der Kongruenz  $\mathfrak{G}$  ( $\mathfrak{G}'$ ) projektiv in der Weise, daß die  $\infty^{2,1}$  die Ebene  $G$  ( $G'$ ) enthaltenden Ebenenbüschel projektiv auf die Geradenbüschel der linearen Kongruenz  $\mathfrak{G}$  ( $\mathfrak{G}'$ ) bezogen werden. Bei dieser Zuordnung entsprechen den Ebenenbüscheln allgemeiner Lage des Bündels  $J$  ( $J'$ ) (Geraden als Orte von Ebenen des Bündels) Reguli aus Kongruenzgeraden der linearen Kongruenz  $\mathfrak{G}$  ( $\mathfrak{G}'$ ). Den beiden Zuordnungen sei jedoch die Beschränkung auferlegt, daß dem gemeinsamen Ebenenbüschel der Ebenenbündel  $J, J'$  (dessen Trägergerade die Gerade  $\mathfrak{P} = JJ'$  ist), ein und derselbe, nämlich der den Kongruenzen  $\mathfrak{G}$  und  $\mathfrak{G}'$  gemeinsame Regulus, (der Regulus zweiter Art der absoluten Fläche) zugeordnet wird.

Ebene allgemeiner Lage: Einer Ebene allgemeiner Lage des Bündels  $J$  ( $J'$ ) entspricht in der Zuordnung eine Gerade der Kongruenz  $\mathfrak{G}$  ( $\mathfrak{G}'$ ). Dieser Geraden entspricht aber umgekehrt ein Ebenenpaar des

Ebenenbündels  $J (J')$ . Das Ebenenpaar hat eine durch  $J$  und in  $G$  verlaufende Schnittgerade  $\mathfrak{U}$  und liegt harmonisch zu dem Paar der Ebenen  $G = \mathfrak{U}\Omega$  und  $\mathfrak{U}\mathfrak{P}$ . Dabei entspricht  $\mathfrak{U}$  als Ebenenort dem Geradenbüschel, dem die abgebildete Kongruenzgerade angehört.

Ebenenbüschel allgemeiner Lage: Einem Ebenenbüschel allgemeiner Lage des Bündels  $J (J')$  entspricht in dieser Zuordnung, wie bereits gesagt, ein Regulus der Kongruenz  $\mathfrak{G} (\mathfrak{G}')$ . Die so entstehenden  $\infty^2$  Reguli („sphärische Reguli“<sup>79</sup>) sind gekennzeichnet als diejenigen Reguli der Kongruenz  $\mathfrak{G} (\mathfrak{G}')$ , die eine Erzeugende 2. Art der absoluten Fläche enthalten. Diese Erzeugende 2. Art bildet zusammen mit der Geraden  $\mathfrak{G} (\mathfrak{G}')$  das Blatt, das die mit dem Regulus verbundene „orientierte“ Fläche 2. Ordnung mit der „orientierten“ absoluten Fläche gemeinsam hat. — Umgekehrt entspricht einem Regulus der Kongruenz  $\mathfrak{G} (\mathfrak{G}')$ , dessen zugehörige Fläche 2. Ordnung mit der absoluten Fläche in Oskulation liegt, ein Paar von Geraden (als Ebenenörter) im Bündel  $J (J')$ . Dieses Geradenpaar liegt mit der Geraden  $\mathfrak{P}$  in einer Ebene, und ist harmonisch zu dem Geradenpaar bestehend aus der Geraden  $\mathfrak{P}$  und der Schnittgeraden der Ebene  $\mathfrak{G}$  mit der Ebene des ersten Geradenpaares.

Konstruktion der einem Punkte von  $R_3^I$  zugeordneten Komplexgeraden. Ein Punkt  $X$  allgemeiner Lage des Raumes  $R_3^I$  bestimmt zusammen mit der Geraden  $\mathfrak{P} = JJ'$  eine Ebene  $E^*$ ; in ihr liegen je eine Gerade der Bündel  $J$  und  $J'$ , die  $X$  mit  $J$  und  $J'$  verbindet. Der Ebene  $E^*$  entspricht in unserer Zuordnung eine Erzeugende  $\mathfrak{G}^*$  der zweiten Erzeugendenschar der absoluten Fläche. Der Geraden  $XJ$  des Bündels  $J$  wird eine orientierte Fläche 2. Ordnung zugeordnet, die die Gerade  $\mathfrak{G}$  (als Gerade der ersten Schicht) und die Gerade  $\mathfrak{G}^*$  (als Gerade der zweiten Schicht) enthält. Ebenso wird der Geraden  $XJ'$  des Bündels  $J'$  eine orientierte Fläche 2. Ordnung zugeordnet, die die Gerade  $\mathfrak{G}'$  (als Gerade der ersten Schicht) und die Gerade  $\mathfrak{G}^*$  (als Gerade der zweiten Schicht) enthält. Diese beiden orientierten Flächen 2. Ordnung haben ein Blatt gemeinsam, dessen Gerade der zweiten Schicht die Erzeugende  $\mathfrak{G}^*$  der absoluten Fläche ist. Die Gerade erster Schicht  $\mathfrak{X}$  dieses Blattes ist diejenige Tangente der absoluten Fläche, die in unserer Punkt-Geradenverwandtschaft dem Punkte  $X$  von  $R_3^I$  zugeordnet ist.

Konstruktion der einem Punkte  $X$  des Raumes  $R_3^I$  zugeordneten Geraden des linearen Komplexes im Raume  $R_3^I$ : Durch einen Punkt  $Y$  allgemeiner Lage des Raumes  $R_3^I$

<sup>79</sup> H. Beck, a. a. O. S. 55.

läuft je eine Gerade  $\mathfrak{T}$  der Kongruenz  $\mathfrak{G}$  und eine Gerade  $\mathfrak{T}'$  der Kongruenz  $\mathfrak{G}'$ . Der Geraden  $\mathfrak{T}$  der Kongruenz  $\mathfrak{G}$  ist im Raume  $R_3^I$  ein Ebenenpaar  $T_1, T_2$ ; der Geraden  $\mathfrak{T}'$  der Kongruenz  $\mathfrak{G}'$  ein Ebenenpaar  $T'_1, T'_2$  zugeordnet, wobei das Ebenenpaar  $T_1, T_2$  ( $T'_1, T'_2$ ) sich mit der Ebene  $G$  ( $G'$ ) und der Verbindungsebene der Schnittgerade  $T_1 T_2$  ( $T'_1 T'_2$ ) mit der Geraden  $\mathfrak{P}$  in harmonischer Lage befindet. Hieraus kann gefolgert werden, daß die Schnittgeraden entsprechender Ebenen — die Bildgeraden des Punktes  $Y$  von  $R_3^{II}$  im linearen Komplex —:

$$\mathfrak{D}_1 = T_1 T'_1, \mathfrak{D}_2 = T_2 T'_2 \text{ }^{80)}$$

zusammen mit der Geraden  $\mathfrak{P} = JJ'$  und  $\mathfrak{Q} = GG'$  einem Regulus angehören und von den Geraden  $\mathfrak{P}$  und  $\mathfrak{Q}$  harmonisch getrennt werden.

---



---

<sup>80</sup> Die Geraden  $\mathfrak{D}_1' = T_1 T_2', \mathfrak{D}_2' = T_2 T_1'$  erfüllen den zu dem oben angegebenen in Bezug auf  $\mathfrak{P}, \mathfrak{Q}$  harmonischen Komplex. Ist für zwei zusammengehörige Ebenenpaare die Art der Zuordnung bestimmt, so auch für alle übrigen.

### Lebenslauf.

Ich, Wilhelm Brach, wurde in Bonn am 14. 5. 1909 als Sohn des Architekten Gerhard Brach und seiner Ehefrau Barbara, geb. Radermacher, geboren. Von Ostern 1918 an besuchte ich das Städtische Gymnasium und Realgymnasium zu Bonn, das ich Ostern 1927 mit dem Zeugnis der Reife verließ. Hierauf studierte ich an den Universitäten Bonn (S.S. 1927 und W.S. 1927/28), Wien (S.S. 1928), Bonn (seit W.S. 1928/29) vornehmlich Mathematik, Physik, Angewandte Mathematik und Chemie. Am 18./19. Januar 1935 legte ich die wissenschaftliche Prüfung für das höhere Lehramt ab.

Die mündliche Doktorprüfung fand am 24., 25. und 26. Juni statt.

Allen meinen Lehrern bin ich zu großem Dank verpflichtet, insbesondere Herrn Professor E. A. Weiss, der mir zu vorliegender Arbeit die Anregung gab und mich während meines ganzen Bonner Studiums in kameradschaftlicher Weise unterstützte.



